

ID: 2014-05-24-T-3383

Тезис

Спицына М.Ю.

Анатомические особенности расположения злокачественных опухолей печени и тактика их оперативного лечения

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чухахин Н.В.

Актуальность. Совершенствование диагностики и лечения злокачественных опухолей печени является актуальной проблемой современной медицины. В России частота гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) составляет 1-2% от всех злокачественных новообразований (Двойрин В.В., 1992).

Цель и задачи исследования: выявить наиболее частую анатомическую локализацию опухолей в печени, частоту встречаемости данной локализации и изучить методы оперативного лечения заболевания.

Материал и методы. Был проведен анализ результатов лечения 40 больных со злокачественными новообразованиями печени, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии за период 2010-2013 год включительно. Возраст больных составил от 30 до 60 лет, из них мужчин 28 (70%) и женщин 12 (30%). Все 40 (100%) были прооперированы, из них 36 (90%) выписались с относительно благоприятным исходом, а 4 (10%) со смертельным исходом.

Результаты. При МРТ - картине печени диаметр опухолевого образования у 23 (57,5%) больных составил от 4 до 5 см; у 10(25%)- 2 до 3 см, у 7(17,5%)- от 0,5 до 0,9 см. Преимущественная локализация наблюдалась в V сегменте печени у 19 (47,5%), в VII сегменте- у 14(35%), в II,III- у 6 (15%), всю долю печени, преимущественно левую опухолевое образование занимало у 1 (2,5%) больного. В V сегменте находились опухолевые образования преимущественно округлой формы, в VII- неправильной, и бугристая форма опухоли наблюдалась во II и III сегментах печени. Наиболее прогрессировали опухоли неоднородной консистенции, они наблюдались у 33 (82,5%) больных, у 7 (17,5%) больных образование имело жидкостной характер и наиболее благоприятное течение. Тонкоигольная аспирационная биопсия печени под контролем УЗИ была проведена у 7 (17,5%) пациентов, у 29(72,5%) гемигепатэктомия, у 4 (10%)- параопухолевая резекция печени.

Выводы. Наиболее часто злокачественными опухолевыми образованиями печени страдают мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, превалирует диаметр опухоли от 4-5 см, локализующиеся в V, VII сегменте печени, что указывает на несвоевременную обращаемость пациентов. Операцией выбора при злокачественных опухолях печени является гемигепатэктомия.

Ключевые слова: опухоль печени, локализация