

ID: 2014-05-1276-T-3739

Тезис

Пронина И.С.

Антибактериальная терапия обострения хронического пиелонефрита в условиях реальной клинической практики*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии**Научный руководитель: к.м.н. Магдеев Р.М.*

Хронический пиелонефрит является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний мочевыделительной системы. Несмотря на большое разнообразие антибактериальных средств в арсенале врачей для лечения острых и хронических форм пиелонефрита до сих пор остро стоит проблема выбора препарата.

Цель исследования: изучение частоты назначения различных групп антибактериальных препаратов для лечения обострения хронического пиелонефрита в условиях реальной клинической практики (отделения нефрологии одной из больниц г. Саратова) в 2013 году.

Материал и методы. Оценку антибактериальной терапии мы провели путем анализа историй болезни пациентов (003/у). В специально разработанной индивидуальной регистрационной карте отмечались демографические данные пациентов; основной диагноз; антибактериальные препараты, назначенные больному в ходе стационарного лечения с указанием режима их применения (доза, кратность, путь введения); адекватность контроля на фоне применяемой терапии.

В ходе исследования было проанализировано 129 историй болезней пациентов с обострением хронического пиелонефрита. Диагноз был подтвержден клиническими, инструментальными и лабораторными данными. У женщин заболевание диагностировалось чаще 97 (75,2%). Средний возраст пациентов составил $45 \pm 2,3$ года. Наиболее часто назначаемыми антибиотиками в исследованной группе были цефалоспорины 46 (35,7%) пациентов. Чуть реже назначались фторхинолоны - 41 (31,8%) и макролиды 32 (24,8%) случаев. Значительно реже применялись пенициллины и аминогликозиды 3 (2,3%) и 7 (5,3%) соответственно. Продолжительность антибиотикотерапии составила в среднем 9 ± 2 дней.

Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось установить, что наиболее часто применяемыми группами антибиотиков, для терапии обострения хронического пиелонефрита являются цефалоспорины, фторхинолоны и макролиды. Это соответствует современным представлениям о терапии данной патологии и сопоставимо с общероссийскими показателями.

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, антибактериальные средства