

Компания PRO.MED.CS Praha a.o. информирует читателей журнала о выходе на Российский рынок препарата ИТОМЕД (итоприда гидрохлорид). Номер регистрационного удостоверения: ЛП-001128 от 03.11.2011. Препарат относится к группе прокинетики.

В современной гастроэнтерологии уделяется большое внимание проблеме нарушений моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. Такой интерес вызван значительной распространенностью этих заболеваний, снижением качества жизни, в основном лиц молодого и трудоспособного возраста. Стимулирующее действие на моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ оказывают препараты из различных групп, но ряд препаратов неприменяются из-за выраженных побочных эффектов, эффективность других нуждается в дальнейшем изучении.

Прокинетики чешской компании PRO.MED.CS Praha a.o. ИТОМЕД (итоприда гидрохлорид) обладает комбинированным механизмом действия, является одновременно антагонистом дофаминовых рецепторов и блокатором ацетилхолинэстеразы. Препарат активирует высвобождение ацетилхолина и препятствует его преобразованию. ИТОМЕД (итоприда) усиливает пропульсивную моторику ЖКТ. Кроме того, препарат оказывает противорвотный эффект, который возможен благодаря взаимодействию с D2-дофаминовыми рецепторами триггерной зоны. Препарат метаболизируется в печени под действием флавин-зависимой

монооксигеназы, без участия цитохрома P450. Также ИТОМЕД (итоприда) повышает приверженность пациентов к проводимой терапии за счет выгодной фармакоэкономики.

Показанием для применения препарата Итомед является симптоматическое лечение функциональной неязвенной диспепсии (хронического гастрита): метеоризм, гастроалгия, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, анорексия, изжога, тошнота, рвота.

Препарат противопоказан при гиперчувствительности к итоприду или любому вспомогательному компоненту препарата, желудочно-кишечном кровотечении, механической обструкции и перфорации ЖКТ, дефициту лактозы, непереносимости лактозы, глюкозо-галактозной мальабсорбции, в детском возрасте (до 16 лет), при беременности и в период лактации.

Применяется Итоприда внутрь, до еды, по 1 таблетке 3 раза в сутки. Суточная доза препарата составляет 3 таблетки (150 мг). У пожилых пациентов дозу снижают.

Если препарат не был принят вовремя, то в дальнейшем его следует принимать через равные промежутки времени. Не рекомендуется принимать препарат в двойной дозе для компенсации пропущенной.

ИТОМЕД (итоприда) представлен в РФ в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой и содержащий 50 мг итоприда гидрохлорида № 40 и № 100.