

ID: 2014-03-257-T-3851

Тезис

Юрьева М.В.

Клинико-anamnestические факторы риска развития цервикальной неоплазии

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, кафедра патологической анатомии

Научные руководители: д.м.н., профессор Маслякова Г.Н., к.м.н., доцент Нейфельд И.В.

Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) занимает первое место среди злокачественных новообразований гениталий и ежегодно прогрессирует.

Цель: выявить факторы риска (ФР) развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН).

Материал и методы. Анализ историй болезней и анкетирование 30 пациенток с подтвержденным наличием ЦИН I-III, госпитализированных в 2 ГКБ им. В.И. Разумовского г. Саратова.

Результаты. С высокой частотой (38,4%) отмечались ИППП в анамнезе; неспецифический вагинит и бактериальный вагиноз в общей сложности присутствовал у 69,3% опрошенных, вагинальный кандидоз – у 84,7%; вирус папилломы человека (ВПЧ) – у 83,3%. О роли ВПЧ в развитии РШМ были информированы 7,7% пациенток; 46% респонденток не знали об этом даже на момент опроса.

У 23% пациенток отмечалось более 5 половых партнеров, у 15,3% – ранний сексуальный дебют. Оральные контрацептивы использовали 23% женщин, 53,8% – презервативы.

Дисменорею отмечали 46% опрошенных.

Травмы шейки матки в родах имели 61,5% женщин. 84,6% респонденток прерывали беременность, из них 38,5% – более трех раз.

Семейный анамнез по цервикальной патологии отягощен у 53,8% опрошенных.

У 61,5% женщин мужа – курильщики; 23,1% респонденток сами являются курильщицами, из них 33,3% интенсивно курят с подросткового возраста.

У 23% женщин отмечалось наличие профессиональных вредностей.

Жительницы города составили 92,3%.

Снижение иммунореактивности, исходя из наличия частых простудных заболеваний, предположено у 23% женщин, из которых поливитамины не потребляли 53,9%.

Выводы. У женщин с ЦИН выявлено наличие нескольких ФР, в среднем 11,2 (от 7 до 17).

Таким образом, формирование ЦИН характеризуется полиэтиологичностью и в 83,3% случаев, как показало наше исследование, является результатом потенцированного действия ВПЧ и выявленных предрасполагающих факторов. В то же время 16,7% случаев наличия ЦИН не связано с инфицированием ВПЧ и может быть обусловлено другими ФР, которые, в свою очередь, могут иметь значение в формировании групп риска по развитию РШМ.

Ключевые слова: факторы риска, цервикальная неоплазия, ВПЧ.