

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

ШАПЛЫГИН Л.В., МОНАКОВ Д.М.

ФГУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко Минобороны России»
(Москва)

По данным EAU распространённость мочекаменной болезни среди онкологических больных выше в 3,2 раза, чем в целом в популяции. Причинами этого являются нарушения уродинамики, метаболизма, а также инфекции мочевыводящих путей. Лучевая и химиотерапия также могут создать предпосылки для формирования конкрементов в мочевыводящих путях (Иваненко К. В., 2006). Цель исследования: оценить распространённость мочекаменной болезни среди пациентов онкоурологического отделения многопрофильного стационара. Материалы и методы исследования. Нами проведён ретроспективный анализ 321 истории болезни пациентов (289 мужчин и 32 женщины), находившихся на лечении в онкоурологическом отделении в период с января 2008 г. по декабрь 2010 г. Средний возраст пациентов составил $63,4 \pm 6,9$ года. Рак предстательной железы диагностирован 122 пациентов, рак мочевого пузыря – у 81 (64 мужчины и 17 женщин), рак почки – у 73 (59 мужчин и 14 женщин), рак яичка – 26, рак почечной лоханки и мочеточника – 11 пациентов (9 мужчин и 2 женщины), рак полового члена – 8 пациентов. Пациентам проводилось комплексное обследование, которое включало ультразвуковое и рентгеновские (в том числе мультиспиральную компьютерную томографию) исследования. Результаты исследования и их обсуждения. Мочекаменная бо-

лезнь диагностирована у 124 пациентов (38,6%) – 113 мужчин и 11 женщин. Конкременты локализовались в почечных чашечках – у 104 пациентов, в почечной лоханке – у 17 и в мочеточнике – у 3 пациентов. У 112 пациентов мочекаменная болезнь была диагностирована на догоспитальном этапе, у 12 – выявлена в ходе обследования по поводу новообразования. В 119 клинических наблюдениях заболевание протекало бессимптомно, у 5 пациентов в период госпитализации развилась почечная колика. Данный факт можно объяснить тем, что большинство пациентов с развёрнутой клинической картиной мочекаменной болезни, обусловленной камнем мочеточника или почечной лоханки, получали лечение по поводу неё до госпитализации, а конкременты почечных чашечек в большинстве случаев протекают бессимптомно. Выводы. Распространённость мочекаменной болезни среди пациентов онкоурологического отделения многопрофильного стационара достаточно высока – 38,6%. У 96% пациентов мочекаменная болезнь протекает бессимптомно. Локализация конкрементов в почечных чашечках у большинства пациентов (83,9%) не препятствует началу лечения по поводу онкологического заболевания, однако требует повышенного внимания к таким пациентам в процессе лечения, регулярного контроля локализации и размеров конкремента.