

ID: 2014-05-1151-T-3589

Тезис

Ерусланова Н.Р.

Нейрокогнитивные нарушения у больных с соматоформными расстройствами

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Научный руководитель: асс. Маслова Н.В.

Пациенты с соматоформными расстройствами часто предъявляют жалобы на снижение когнитивных функций, что отражает актуальность изучения нейрокогнитивных особенностей при расстройствах изучаемого спектра.

Цель исследования: изучение динамики нейрокогнитивных нарушений у больных с соматоформными расстройствами в процессе терапии.

Задачи исследования:

1. Оценить когнитивные нарушения больных соматоформными расстройствами до начала терапии и в процессе лечения;
2. Провести статистический и сравнительный анализ полученных результатов.

Было обследовано 20 пациентов с соматоформным расстройством (12 женщин и 8 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет). Обследованные пациенты не имели сопутствующей соматической патологии, признаков органического поражения нервной системы.

Пациенты обследовались до начала терапии и на 7 и 14 день.

Для оценки состояния словесного механического запоминания, опосредованного запоминания, вербально-логической памяти, особенностей мышления и внимания испытуемых использовались методики: «10 слов», "Толкование пословиц" «Пиктограммы», "Таблицы Шульте", «Воспроизведение рассказов», «Образная память».

Результаты. Кратковременная слуховая память, отсроченное воспроизведение, объем опосредованного запоминания, образная память и вербально-логическое запоминание до начала терапии и на 7 и 14 день лечения соответствовали среднестатистической норме или представляет крайнюю степень нормы.

Объем, устойчивость, и концентрация внимания больных до начала терапии представляли крайнюю степень нормы, к концу лечения показатели приобрели незначительное улучшение.

Анализ пиктограмм и интерпретаций пословиц показал склонность больных к конкретному мышлению.

У пациентов средний уровень целенаправленности и обобщения мышления, средний уровень умения оперировать переносным смыслом.

Выводы. Особенности памяти и внимания больных в среднем не отклонялись от нормы или соответствовали крайней степени нормы; мышление склонно к конкретизации. Лечение, существенным образом, не оказало влияния на когнитивную сферу больных.

В целом, полученные результаты, соответствуют результатам аналогичных исследований.

Ключевые слова: нейрокогнитивные, соматоформные, Саратовский, Разумовского, мышление