

ОБЩИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТЫ

Корсакова Н.В.

ФГОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", курс глазных болезней, г. Чебоксары.

В процессе возникновения болезней большое значение имеют нервные и психические факторы. Еще Н.И. Пирогов отмечал, что у солдат отступающей армии раны заживают медленнее, чем у солдат-победителей. Универсальный механизм патологии А.Д. Сперанский видел в нервно-дистрофических процессах, связанных с ранними стадиями различных заболеваний. Возможно системный подход к изучению общего состояния пожилых пациентов, страдающих помутнением хрусталика, позволит раскрыть существенные патогенетические механизмы и возрастной катаракты.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить и провести сравнительный анализ заболеваний, сопутствующих формированию отдельных видов возрастной катаракты у человека.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В период с декабря 2004 года по август 2006 года в ходе первичной офтальмологической диагностики и анализа данных амбулаторных карт 116 пациентов старше 60 лет проведено сплошное статистическое исследование. Исследуемые пациенты разделены на две группы: 1-я группа – пациенты, страдающие возрастной корковой катарактой (48 человек); 2-я группа – пациенты, страдающие возрастной ядерной катарактой (70 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Между формированием отдельных видов возрастной катаракты и характером сопутствующих заболеваний установлена выраженная частотная зависимость. Обнаружено, что пациенты, состоящие на учете по поводу возрастной корковой катаракты, чаще страдают гипертонической болезнью (52,1%), у пациентов с ядерной катарактой лишь в 1,4% случаев. Интересно, что среди пациентов с возрастной ядерной катарактой наиболее распространены симптоматическая гипертензия (61,4%) и атеросклероз церебральных сосудов (58,6%), которые при корковой катаракте встречается лишь в 6,25 и 22,9% случаев, соответственно. Частота сопутствующего катаракте сахарного диабета практически одинакова во всех группах пациентов и составляет 2,1 и 2,9%, соответственно. Важно, что при изучении частоты сопутствующих злокачественных новообразований, онкологический анамнез пациентов 2-й группы отягощен в 11,4% случаев, в 1-й группе пациентов – значительно реже, лишь 2,1%.

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ заболеваний, сопутствующих формированию отдельных видов возрастной катаракты у человека, демонстрирует закономерные проявления возрастной инволюции различных отделов вегетативной нервной системы.