

ID: 2014-04-3881-T-3248

Тезис

Талалайко О.С., Власова Д.В.

### **Особенности течения многоформной экссудативной эритемы в старческом возрасте**

*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней*

*Научный руководитель: к.м.н, асс. Игонина И.А.*

Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) — острое, нередко рецидивирующее заболевание кожи и слизистых (О. Л. Иванов, 1997). Этиологические факторы МЭЭ разнообразны. У пациентов с этим диагнозом имеется пусковой фактор, «включающий» механизм иммунной реакции гиперчувствительности. Пусковые факторы делят на две группы: аллергены медикаментозной, пищевой и т. д. природы, вызывающие токсико-аллергическую разновидность дерматоза, и инфекционные — вирусы, бактерии, простейшие, которые становятся причиной инфекционно-аллергической формы МЭЭ. Заболевание чаще встречается у лиц моложе 20 лет, гораздо реже у лиц старшего возраста.

**Цель исследования:** описание клинического случая МЭЭ в возрасте старше 90 лет.

Под нашим наблюдением пациентка в возрасте 91 года, которая обратилась в стационар с жалобами на зуд, жжение в области очагов поражения на коже туловища и конечностей. Дебют заболевания 3 недели назад, когда в области левой щеки появился зудящий очаг эритемы. Амбулаторно получала цефазолин в/м 3 р/сут, хлоропирамин внутрь с некоторым улучшением. Через неделю процесс распространился на кожу туловища. Амбулаторно был введен раствор бетаметазона дипропионат 4мл в/м-без эффекта. При поступлении в стационар объективно: в области груди, плеч, предплечий, кистей, голеней — симметричные диффузные очаги эритемы с цианотинным оттенком, четкими границами, размерами до 30-45 см, на этом фоне определяются буллезные элементы, множественные эрозии с серозными и серозно-геморрагическими корками, по периферии эрозий — обрывки эпидермиса, на коже кистей — обильное крупно- и мелкопластинчатое шелушение. В области спины, живота, бедер — множественные пятнисто-папулезные эфлоресценции ярко-розового цвета с цианотичным оттенком.

Выставлен диагноз: Многоформная экссудативная эритема.

**Вывод.** Многоформная экссудативная эритема в старческом возрасте может проявляться яркой клинической симптоматикой.

**Ключевые слова:** эритема