

Г.У.Туксанбаева, Г.А. Мустапаева, С.С.Кыдыралиев, А.Х. Пайзахметов

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА L - ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ОСТРОЙ СТАДИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

МКТУ им. Х.А. Ясави, кафедра нервных болезней, г. Шымкент

Цель работы: изучение эффективности препарата L - лизина эсцинат фирмы Артериум, обладающего эксудативным, противовоспалительным, антиагрегантным, нормализующим микроциркуляцию, эндотелиотропным действием при отеке головного мозга в острой стадии церебрального ишемического инсульта.

Методы: обследованы 35 больных в возрасте от 18 до 68 лет с отеком головного мозга в острой стадии церебрального ишемического инсульта. У больных с ИИ уровень нарушения сознания оценивался в 1-5 сутки ИИ по шкале Глазго, тяжесть и степень выраженности неврологического дефицита объективизировали с помощью шкалы (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 1991). Интенсивная терапия в 1-й группе (18 больных) проводилась с назначением базисного комплекса лекарственных препаратов, во 2-й группе (17 больных) на фоне стандартной терапии ИИ получали дополнительно 0,1% раствора L - лизина эсцинат по 10,0 мл в/в кап два раза в сутки в течение 10 дней.

Результаты: Анализ клинической динамики в группах больных с ИИ показал достоверное ускорение регресса неврологического дефицита по среднему баллу оригинальной шкалы к 10-м суткам заболевания, где в 1-й группе отмечено

ухудшение общего состояния в виде снижения суммарного клинического балла с $35,85 \pm 0,12$ до $33,32 \pm 0,92$, во 2-й группе увеличение - с $35,17 \pm 0,19$ до $38,78 \pm 1,16$. Летальность среди больных, у которых наблюдались прогрессирующее нарастание общемозговой симптоматики и неврологического дефицита, развитие интра-либо экстрацеребральных осложнений, в 1-й группе составила 22,2% (4 из 18чел.), тогда как во 2-й группе 11,6% (2 из 17 чел.) выявлен достоверный рост

Обсуждение: анализ динамики среднего балла к 10-м суткам по степени тяжести ИИ свидетельствует об улучшении клинической картины при относительно удовлетворительном состоянии, состоянии средней степени тяжести, крайне тяжелом состоянии во 2-й группе и отсутствии достоверного регресса симптоматики у больных в тяжелом состоянии в 1-й группе.

Выводы: позитивная динамика клинической картины у больных с церебральным ишемическим инсультом различной степени тяжести показала при интенсивной терапии ИИ клиническую эффективность и безопасность применения препарата L - лизина эсцинат фирмы Артериум.