

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МИГРЕНИ

Сероусова О. В., Долгушина А. И., Карпова М. И.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Челябинск, Россия

PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL DISTURBANCES IN PATIENTS WITH MIGRAINE

Serousova O. V., Dolgushina A. I., Karpova M. I.

South Ural Medical University, Chelyabinsk City

Цель. Изучение распространенности гастроинтестинальных расстройств при мигрени во время иктальной фазы, а также сопутствующей патологии органов пищеварения при различных вариантах течения данной цефалгии.

Материалы и методы. В исследование включено 158 больных мигренью в соответствии с МКГБ (II-е издание, 2004). Из них 96 пациентов с эпизодическими атаками (66 женщин и 30 мужчин), хроническое течение диагностировано в 62 случаях (52 женщины, 10 мужчин). Лекарственный абюзус при головной боли наблюдался у 39 (62,9%) больных с хроническим течением мигрени. Медиана возраста больных составила 29 лет.

Результаты. В структуре болевой фазы мигрени, тошнота и рвота встречались в 76 (79,1%) и 37 (38,5%) случаях соответственно при эпизодической мигрени, у 43 (69,3%) и 10 (12,9%) больных при ее хронизации. Заболевания, ассоциированные с *Helicobacter pylori*-инфекцией (K29, K25, K26), встречались чаще у больных хронической мигренью (17 случаев, 27,4%) против 8 (8,3%) случаев при эпизодическом течении. Проявлениями *Helicobacter pylori*-инфекции служили хронический атрофический гастрит (4,2% и 19,4% случаев), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (4,2% и 8,1% соответственно типам течения цефалгии). Хронический некалькулезный холецистит (K81.1) был диагностирован 4 (4,2%) при эпизодических атаках и у 4 (6,5%) больных при хронической цефалгии. Распространенность функциональных заболеваний билиарного тракта (K83.8) и кишечника (K58) составила 6 (6,3%) и 5 (5,2%) при эпизодической, при хронической мигрени 4 (6,5%) и 4 (6,5%) соответственно.

Выводы. У пациентов, страдающих мигренью, зарегистрирована высокая распространенность гастроинтестинальных расстройств. Предполагается, что в развитии данных заболеваний принимает участие ряд факторов, включая нарушения вегетативной регуляции, инфекционно-воспалительные механизмы, а также экзогенные факторы, среди которых особое место занимает частый прием лекарственных препаратов для купирования головной боли.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2014; 111 (11):89

Ekspierimental'naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2014; 111 (11):89