

ID: 2014-11-1149-T-4365

Тезис

Борисова И.А.

Результаты комплексного лечения содружественного косоглазия у детей

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней

Актуальность. Заболевания глазодвигательного аппарата являются одной из причин нарушений зрительных функций в детском возрасте. По обобщенным данным содружественным косоглазием страдают около 2-3% детей. Косоглазие является косметическим и функциональным дефектом, влияющим на развитие ребенка, ограничивающим его в выборе профессии и существенно повышающим опасность травматизма у детей, вследствие нарушения возможности оценивать пространственные соотношения предметов. Определяющими для правильного формирования бинокулярной функции являются первые 3 года жизни ребенка. Поэтому лечение косоглазия у детей важно проводить своевременно и длительно. Что определило цель нашего исследования.

Цель: повышение остроты зрения у детей с содружественным косоглазием с последующим формированием бинокулярного зрения.

Задачи:

1. Проанализировать состояние зрительных функций у детей с содружественным косоглазием: исходных, после I этапа, после хирургического лечения и повторных курсов аппаратной терапии.
2. Выявить количество детей (%), у которых сформировалось бинокулярное зрение.

Материал и методы. Исследование охватило группу из 10 детей, проходивших лечение содружественного косоглазия в КГБ СГМУ с 2010 по 2014гг. В качестве исходных данных всем детям проводили стандартное офтальмологическое обследование, определяли характер зрения, рефракцию; 1 этап - аппаратное лечение, 2 этап - хирургическое пособие и, как заключительный этап - повторные курсы аппаратного лечения.

Результаты. После проведенного комплексного лечения у всех детей отмечено повышение остроты зрения, уменьшение углов девиации. По окончании наблюдения бинокулярное зрение сформировалось у 60% исследованных детей.

Выводы.

1. Лечение содружественного косоглазия – длительный, многоступенчатый процесс, результаты которого во многом зависят от возраста ребенка на момент возникновения косоглазия, своевременности начала и систематичности терапии.
2. Целесообразно применять раннее хирургическое лечение с предварительной и последующей оптической коррекцией и функциональным лечением.

Ключевые слова: содружественное косоглазие, бинокулярное зрение