

ID: 2015-05-376-T-4936

Тезис

Борисова А.А., Бондаренко К.С.

**Случай синдрома Маршалла (PFAPA-синдром) у ребенка раннего возраста***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии**Научные руководители: к.м.н. Скупова О.В., к.м.н. Спиваковский Ю.М.*

Синдром Маршалла (PFAPA-синдром) - это синдром, включающий периодическую лихорадку (Periodic Fever), афтозный стоматит (Aphthous stomatitis), фарингит (Pharyngitis) и шейный лимфаденит (cervical Adenitis). В связи со сходством клинической картины его относят в группу наследственных периодических синдромов, но конкретного мутантного гена, вызывающего данное заболевание, пока не обнаружено.

Мальчик, 3 лет 8 мес., поступил в клинику с жалобами на повторные эпизоды повышения температуры тела до фебрильных цифр продолжительностью 3-4 дня с периодичностью 1 раз в месяц, сопровождающиеся увеличением шейных лимфатических узлов, налетами на миндалинах. Вышеперечисленные жалобы отмечаются у ребенка с 1 г. 8 мес.

Во время приступа в общем анализе крови выявлен лейкоцитоз до  $12,9 \cdot 10^9/\text{л}$ , ускорение СОЭ до 45 мм/час, в биохимическом анализе крови – значительное повышение С-реактивного протеина до 119,9 мг/мл.

Ребенок обследован по алгоритму лихорадящего больного, выполнена Ro-графия органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек, ДЭХО-КГ.

Учитывая четкую периодичность возникновения приступов лихорадки с одинаковой клинической картиной, воспалительные изменения в анализах крови в период фебрильного приступа, был заподозрен синдром Маршалла.

Проведен преднизолоновый тест. На фоне введения преднизолона из расчета 1 мг/кг массы тела температура тела снизилась до нормальных значений в течение 4-х часов и более не поднималась.

Клинические симптомы заболевания, воспалительные изменения в анализах крови во время приступа, положительный преднизолоновый тест полностью соответствуют диагностическим критериям синдрома Маршалла, что и позволило выставить окончательный диагноз.

**Выводы.** Наше наблюдение и данные литературы позволяют рассматривать синдром Маршалла как неинфекционное лихорадочное заболевание с высокой периодичностью острых эпизодов.

Своевременная постановка этого диагноза позволяет быстро справляться с острыми эпизодами без применения антибактериальных препаратов.

**Ключевые слова:** лихорадка, синдром Маршалла