

ID: 2014-04-257-T-3442

Тезис

Закора О.А., Магомедова М.М., Шахмарданова С.Р.

Течение и исход беременности при острых респираторных вирусных инфекциях

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Научный руководитель: к.м.н., доцент Романовская А.В.

В период гестации ОРВИ встречается у 2–9% беременных. При этом, даже при стертых клинических проявлениях заболевания, осложнения и отдаленные последствия ОРВИ могут быть значительно тяжелыми.

Цель исследования: изучить течение и исходы беременности при ОРВИ.

Материал и методы. Для решения поставленных задач проведен ретроспективный анализ 152 историй болезни за 2012- 2013 гг. по данным МУЗ «10 ГКБ» г. Саратова. Все беременные были разделены на группы в зависимости от сроков гестации на момент заболевания ОРВИ: I триместр - 27 человек (18%); II триместр - 66 (13%); III триместр - 59 (39%). Обследование женщин, включенных в обозначенные группы, выполнялось согласно единому протоколу.

Результаты. Во всех триместрах в 49,3% случаев преобладали среднетяжелые формы ОРВИ. В I и II триместре преобладали легкие и среднетяжелые формы болезни в 96,3% и 83,4% соответственно. В III триместре в 35,6% случаев отмечались тяжелые формы заболевания. По данным УЗИ патология созревания плаценты выявлена в 34,2% наблюдений. Задержка созревания плаценты чаще выявлялась у беременных, перенесших ОРВИ в I триместре беременности в 22,2% наблюдений. Преждевременное созревание плаценты наиболее часто отмечалось при заболевании ОРВИ во II триместре в 37,9% наблюдений. Патология околоплодных вод выявлена в 11,8% наблюдений. У беременных, перенесших ОРВИ в I триместре гестации, различные нарушения гемодинамики были выявлены в 81,5% наблюдений, во II триместре - в 46,9% и в III триместре - в 35,6%. Преждевременные роды чаще встречались у пациенток перенесших ОРВИ в I триместре - 22,2%, во II триместре - 12,1%, в III триместре - 15,2%. Самопроизвольное прерывание беременности произошло только у женщин перенесших ОРВИ в I триместре - в 18,5% наблюдений.

Заключение. Во время гестации инфекционный агент (вирус) нарушает процессы инвазии трофобласта и созревания плаценты, приводящее к развитию ФПН, что диктует необходимость более тщательного наблюдения за данной категорией беременных.

Ключевые слова: течение, исходы беременности при ОРВИ