

УДК 611.711.8-001-089

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ

© 2006 г. М.Ф. Черкасов, В.К. Татьянченко, С.В. Масленников

Цель работы – изучить особенности отдаленных результатов лечения больных ректоцеле II–III степени.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 50 больных ректоцеле II–III степени, 26 из них (1-я группа) оперированы по способу ГНЦК, в 24 случаях (2-я группа) применен оригинальный метод.

Результаты. В 1-й группе больных через 1 год после операции объективными инструментальными исследованиями у 3 больных выявлена недостаточность сфинктера заднего прохода II степени; у 2 – I ст.; рецидив ректоцеле II–III степени – у 3, затруднения акта дефекации – у 1 больной. Во 2-й группе воз-

врата ректоцеле и запоров в течение 1 года не отмечено, рецидив недостаточности замыкательного аппарата прямой кишки I степени отмечен у одной больной.

Вывод. В целях предупреждения рецидива ректоцеле и недостаточности замыкательного аппарата прямой кишки целесообразно выполнять эндовидео-ассистированную операцию, используя для восстановления мышечно-фасциальных структур нижнего этажа малого таза и промежности мобильный мышечно-фасциальный трансплантат на основе тонкой мышцы бедра (федеральный патент РФ № 1600711).

Ростовский государственный медицинский университет

17 февраля 2006 г.