

подтвердить универсальное значение гиперфилтрации, сниженного функционального почечного резерва для развития почечной недостаточности при различных нефропатиях. Таким образом, определены возможности раннего прогнозирования функционального поражения почек при почечнокаменной болезни, патологии единственной почки, поликистозе почек. Установлены средняя продолжительность ХПН, темпы прогрессирования почечной недостаточности при основных нефропатиях в Прибайкалье. Выявлены факторы, ускоряющие течение почечной недостаточности при некоторых нефропатиях. Среди них факторы, непосредственно связанные с причинным заболеванием, и универсальные факторы, действующие при всех нефропатиях. К последним относятся: тяжелая артериальная гипертензия с диастолическим АД 120 мм рт.ст. и выше, суточная протеинурия больше 1 г, а также снижение

активности основных антиокислительных ферментов крови.

Положительный эффект от диагностики ранних функциональных нарушений и от индивидуализации лечебных мероприятий с учетом действия ускоряющих факторов скажется на увеличении продолжительности жизни больных с ХПН.

Материалы исследования использованы при разработке областной программы развития службы заместительной почечной терапии.

Диссертация иллюстрирована 57 рисунками и 421 таблицами. Список литературы содержит 294 источника: 130 отечественных и 164 зарубежных авторов.

G.M. Orlova

"Chronic Renal Insufficiency in Pribajkalje: Spreading, Epidemiological Feature, Risk Factors of Accelerated Progressing".

УДК 616.12-008.331.1-07-08:616.45

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С "ГОРМОНАЛЬНО НЕАКТИВНЫМИ" ОПУХОЛЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Н.М. Быкова.

В ноябре 2002 года на заседании диссертационного совета Д.208.031.01 состоялась защита диссертации Н.М. Быковой "Артериальная гипертензия у больных с "гормонально неактивными" опухолями надпочечников клинко-патогенетическая характеристика" на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности "внутренние болезни". Работа выполнена в Иркутском государственном институте усовершенствования врачей, научный руководитель - член-корреспондент РАМН, профессор А.А. Дзизинский, научный консультант д.м.н., профессор Л.К. Куликов.

Цель настоящего исследования - изучение клинко-патогенетической характеристики артериальной гипертензии у больных с "гормонально неактивными" опухолями надпочечников. Впервые изучены особенности клинического течения, гормонального и электролитного статуса у больных АГ с "гормонально неактивными" опухолями надпочечников, проведены клинко-морфологические сопоставления у таких больных. Выявлены признаки смешанной кортико-медуллярной активности у больных с адрено-кортикальными аденомами и с

опухолью из хромаффинной ткани. Выявлены признаки гормональной активности у больных с псевдокистами надпочечников. Установлено, что наиболее четко определить гормональную активность выявленного новообразования надпочечника можно при определении гормонального профиля в крови из центральных вен надпочечников.

Разработан алгоритм обследования и критерии диагностики больных с "гормонально неактивными" опухолями надпочечников, доказано, что таким больным с неярко выраженными другими клинко-лабораторными данными целесообразно формулировать диагноз, как синдром пре-Кушинга, синдром пре-Конна. Окончательный диагноз возможно выставить только после морфологического исследования опухоли.

В диссертации содержится 42 таблицы и 3 рисунка. Указатель литературы включает 200 работ - 123 отечественных и 77 зарубежных авторов.

N.M. Bukova

"Arterial Hypertension in Patients with Tumors of Adrenal Glands "Not Active Hormonally". Clinical and Pathogenetic Feature".

УДК 616.248-056.3:616.211-002-056.3

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

С.В. Тяренкова.

В ноябре 2002 года на заседании диссертационного совета Д.208.031.01 состоялась защита диссертации С.В. Тяренковой "Распространенность, клинко-этиологическая характеристика, взаимосвязь бронхиальной астмы и аллергического ринита у подростков и взрослых в восточной Сибири" на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности "внутренние болезни". Работа выполнена в Иркутском государственном институте усовершенствования врачей, научный руководитель - д.м.н., профессор Б.А. Черняк.

Цель проведенного исследования: изучить распространенность, клинко-этиологические особенности, факторы риска и взаимосвязь бронхиальной