

ID: 2013-11-8-T-3107

Тезис

Елисеева А.А., Хупсергенова М.С., Блинова В.В.

Compliance больных с различными формами фибрилляции предсердий

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель: оценить compliance больных с различными формами фибрилляции предсердий (ФП).

Материалы и методы. Методом добровольного анкетирования и анализа карт стационарного больного для выяснения compliance были изучены данные клинического обследования 40 больных с различными формами ФП в возрасте от 54 до 87 лет, среди которых было 20 (50%) женщин и 20 (50%) мужчин.

Результаты исследования показали, что постоянная форма ФП диагностирована у 4 (10%), пароксизмальная форма ФП – у 14 (35%), персистирующая форма ФП – у 22 (55%) пациентов. Все пациенты с постоянной ФП (100%) уверены, что их заболевание крайне опасно для жизни, в связи с чем они придерживаются мнения, что если лечить заболевание, то возможно существенное улучшение самочувствия и увеличение продолжительности жизни. 4 (28,6%) больных с пароксизмальной ФП считают свое заболевание крайне опасным для жизни, 8 (57%) – достаточно опасным для жизни, поэтому большинство из них (12 человек, 85,7%) ожидают от лечения существенного улучшения самочувствия и увеличения продолжительности жизни, 2 (14,3%) больных думают, что их заболевание вредит здоровью, но жить с ним не опасно, они же склоняются, что лечение позволяет только улучшить самочувствие. Все пациенты с постоянной и пароксизмальной ФП регулярно принимают лекарственные препараты. Мнение больных с персистирующей ФП о своем заболевании разделилось: 14 (63,6%) больных считают, что их заболевание достаточно опасно для жизни, в связи с чем от проводимого лечения ожидают существенного улучшения самочувствия и увеличения продолжительности жизни, поэтому большинство из них (10 человек, 45,5%) регулярно принимают препараты; 6 (22,3%) считают, что их заболевание вредит здоровью, но жить с ним не опасно, а от лечения можно добиться только улучшения самочувствия, поэтому принимают препараты курсами.

Выводы. Большинство опрошенных пациентов с ФП принимают лекарственные препараты постоянно, но, к сожалению, в данный список входят те препараты, которые заслуживают внимания только с точки зрения самих пациентов. Как правило, полная информированность пациентов о своем заболевании и его осложнениях обуславливает степень compliance.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий