



СМОЛЬКОВА Л.Г., БОЯРКИНА А.В., РАСТОМПАХОВА Т.А.

УДК 616.24:612.17

Кафедра госпитальной терапии ГОУ ВПО «ИГМУ Минздравсоцразвития»,
ГУЗ «Иркутская областная клиническая больница»
г. Иркутск, Россия

Сопутствующая сердечно-сосудистая патология у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких

Актуальность: сочетанная сердечнососудистая (СС) патология у больных ХОБЛ безусловно утяжеляет течение бронхолегочной нозологии, нередко являясь причиной летальных исходов. Лечение сопутствующей СС патологии ограничено в связи с вызываемой бронхообструкцией рядом препаратов. Одновременно имеющаяся гипоксия утяжеляет СС патологию у данной группы пациентов.

Цель исследования: проанализировать частоту встречаемости различной СС патологии у пациентов ХОБЛ в зависимости от возраста и пола, степени тяжести нозологии.

Материалы и методы исследования: проанализированы карты стационарного больного форма № 003у/-м больных ХОБЛ 258 пациентов (м. — 219 и ж. — 39) в возрасте от 18 до 88 лет, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении Областной клинической больницы г. Иркутска в 2008 году. Проведен анализ данных инструментальных, функциональных и лабораторных методов исследования. Статистическая обработка проводилась программой BIOSTAT.

Полученные результаты: изменения на ЭКГ выявлены 41,4% случаев, из них 23,7% — гипертрофия правых отделов сердца, 7,7% — гипертрофия левых отделов сердца, 7% — нарушения ритма. Сопутствующая СС патология была выявлена в 35,2 % случаев, из них ИБС в 1,9%, гипертоническая болезнь в 15,5%, сочетание ИБС с АГ в 17,8 % случаев. Больные ХОБЛ с сопутствующей СС патологией получали фармакологическую нагрузку следующими препаратами: β -блокаторы — бисопролол (конкор) применялся у 16 (6,2%) пациентов; антагонисты кальция — у 5 (1,9%) пациентов; ингибиторы АПФ — 90 (34,8%) пациентам; всем пациентам были назначены диуретики. Непереносимости препаратов не отмечено.

Выводы: получена достоверная зависимость частоты СС патологии от степени тяжести ХОБЛ, а в ряде случаев от пола и возраста пациентов. Несмотря на возможные побочные эффекты, непереносимости лекарственных форм не наблюдалось.