

ID: 2013-09-5-T-2947

Тезис

Новикова Е.Н., Климова Т.В., Набиев Н.В., Русанова А.Г., Панкратова Н.В.

Диагностика трансверсальной окклюзии среди студентов-стоматологов*Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова*

В ходе многолетних и многочисленных исследований установлены значительные колебания частоты распространенности зубочелюстных аномалий. В частности нет однозначного мнения касательно частоты встречаемости трансверсальной аномалии окклюзии (ТАО).

Цель исследования – изучить распространенность ТАО у студентов-стоматологов 18-20 лет.

Материал и методы. Проведен внешний осмотр и осмотр полости рта у 832 студентов-стоматологов 2 (499 студентов) и 3 (333 студента) курсов МГМСУ им. А. И. Евдокимова, возраст которых 18-20 лет. Критериями для включения являлись - асимметрия лица, несовпадение межрезцовой линии.

Результаты. Было установлено, что ТАО встречается у 46,5% студентов 2-го курса. Причем в 23,45% случаев она представлена самостоятельной формой, а в 23,05% в сочетании с другими формами патологии окклюзии. Наиболее часто ТАО во фронтальном отделе сочеталась с дистальной окклюзией (10,42%), реже с прямой резцовой окклюзией (7,42%) и с глубокой резцовой окклюзией (5,01%). Крайне редко (0,2%) ТАО сочеталась с мезиальной окклюзией. У студентов 3-го курса ТАО встречалась несколько чаще, чем у студентов 2-го курса (51,35%). Соответственно возросла частота встречаемости ТАО в виде самостоятельной формы до 25,22%. Встречаемость сочетанных форм патологии окклюзии увеличилась, по сравнению со 2-м курсом и достигла 26,13% случаев. Однако структура сочетанных форм патологии окклюзии в процентном выражении мало различалась у студентов 2-го и 3-го курсов. Так же наиболее часто встречалось сочетание трансверсальной фронтальной резцовой окклюзии с дистальной окклюзией (11,11%), несколько реже - с прямой резцовой окклюзией (8,71%), еще реже – с глубокой резцовой окклюзией (5,41%), и наиболее редкое сочетание выявлено с мезиальной окклюзией зубных рядов (0,9%).

Обсуждение. Результаты нашего исследования отличаются от данных ряда других авторов (Огонян Е.А., 2011; Смолина Е.С., 2000). Существует несколько видов классификаций ТАО, подразделяющие последнюю на разные формы. Но, как указывают А.Б.Слабковская и Л.С.Персин (2010), распространенность ТАО анализируется во многих исследованиях только как распространенность одной из ее форм - перекрестная окклюзия, и значения представляемых данных имеют большой разброс. Кроме того, при сопоставлении данных по распространенности аномалий окклюзии необходимо учитывать контингент обследованных лиц. Так в фундаментальной работе А.Б.Слабковской (2008) распространенность ТАО и сочетание ее с другими аномалиями была оценена у пациентов, обратившихся за ортодонтической помощью.

В настоящее время распространенность ТАО среди студентов крайне высока, что требует изучения этиологии и разработки специальных программ по предупреждению развития и своевременному лечению данной патологии.

Ключевые слова: трансверсальная окклюзия, распространенность