

Таким образом, в результате проведенного исследования была подтверждена эффективность предлагаемого нами комплексного лечения хронических посттравматических головных болей напряжения, сопровождающихся напряжением перикраниальных

мышц, сочетающего назначение мексидола и методов мануальной терапии. Вопрос алгоритмизации выбора конкретных методик мануальной терапии с целью дальнейшего повышения эффективности проводимого лечения требует дальнейшего изучения.

УДК 616.34-007.271-072

Л.К. Куликов, А.А. Смирнов, М.А. Козулин

ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕСТИ ПАРЕЗА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

*Иркутский государственный институт усовершенствования врачей (Иркутск)
Дорожная клиническая больница (Иркутск)*

Разработан способ диагностики степени тяжести пареза желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у больных распространенным перитонитом. Данный метод основан на отношении лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) к суммарной электрической активности. Суммарную электрическую активность определяли методом периферической электрогастроэнтерографии. ЛИИ рассчитывали по формуле Кальфа-Каллифа. Отмечено, что при легком течении распространенного перитонита проявления метаболических нарушений, связанных с парезом ЖКТ, носят обратимый защитный характер, в то время как при перитоните средней и тяжелой степени тяжести, данные проявления являются патологическим звеном развития энтеральной недостаточности.

Ключевые слова: распространенный перитонит, периферическая электрогастроэнтерография

DIAGNOSTICS OF SEVERITY DEGREE OF ILEUS IN PATIENTS WITH PERITONITIS

L.K. Kulikov, A.A. Smirnov, M.A. Kozulin

*Irkutsk State Institute of Physicians' Training, Irkutsk
Railroad Clinical Hospital, Irkutsk*

We developed the method of diagnostics of ileus in patients with disseminated peritonitis. The method is based on ratio of leucocytic index of intoxication and sum electric activity. Sum electric activity was defined by the method of peripheral electrogastroenterography. Leucocytic index of intoxication was calculated by formula of Kalf-Kallif. It is marked that at non-complicated course of disseminated peritonitis manifestations of metabolic disturbances connected with ileus have reversible protective character. These manifestations are pathological link of development of enteral insufficiency.

Key words: disseminated peritonitis, peripheral electrogastroenterography

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что причиной неудовлетворительных результатов лечения распространенного перитонита (РП) является развитие синдрома полиорганной недостаточности, одной из ключевых звеньев которой является бактериальная транслокация в системный кровоток при несовершенстве энтерального барьера [2, 3, 7, 10–12]. Возникновение энтеральной недостаточности при распространенном перитоните связано с вовлечением в инфекционный процесс интрамуральных (автономных) нервных сплетений кишечной стенки, их ишемии и, как следствие этого, появление двигательной дисфункции, т.е. пареза кишечника [10].

Одним из методов диагностики двигательных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является электрогастроэнтерография. Основным ее преимуществом перед другими является более

ранняя диагностика моторно-эвакуаторных изменений кишечника [7]. Метод позволяет регистрировать биоэлектрическую активность гладкомышечных структур ЖКТ. В настоящее время, общепринятым способом регистрации электрофизиологических изменений в кишечной стенке, а именно определение медленно волновой активности, является периферическая электрогастроэнтерография [6, 8]. Метод основан на записи биопотенциалов с поверхности кожи и регистрации их в частотном спектре, характерном для определенного отдела ЖКТ. Параметром для расшифровки электрогастроэнтерограмм является мощность регистрируемого сигнала, которая определяется как отношение амплитудных и частотных величин в регистрируемом спектре. Анализ мощности сигнала (электрической активности), полученного при записи периферической электрогастроэнтерографии, позволяет определить

не только тип двигательной дисфункции ЖКТ, но и степень нарушения метаболизма гладкой мускулатуры кишечника в ответ на воспаление или ишемию [6–8].

В связи с этим раннее определение степени тяжести пареза ЖКТ позволит прогнозировать развитие синдрома энтеральной недостаточности у больных с распространенным перитонитом.

Разработка прогностических критериев, основанных на зависимости между электрической активностью ЖКТ и степенью выраженности интоксикации, является актуальным при выборе лечебной тактики у больных с распространенным перитонитом.

Цель работы: определить критерий тяжести пареза ЖКТ у больных с распространенным перитонитом.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Оценить степень изменения электрической активности ЖКТ по данным периферической электрогастроэнтерографии у больных с распространенным перитонитом

2. Выявить зависимость между степенью интоксикации и суммарной электрической активности (мощности) ЖКТ у больных с распространенным перитонитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено у 22 больных с РП. Критерием включения был диагностированный распространенный перитонит. Больные были разделены на три группы в соответствии с балльной оценкой степени тяжести перитонита, основанной на индексе Мангейма [9], которые представлены в таблице 1.

Распределение больных по причине возникновения перитонита представлено в таблице 2.

Всем больным до операции и в послеоперационном периоде выполнена периферическая элек-

трогастроэнтерография с одновременным забором крови для определения лейкоцитарной формулы. Периферическую электрогастроэнтерографию выполняли на аппарате ЭГЭГ-01К по методике предложенной на кафедре госпитальной хирургии РГМУ (зав. каф. профессор В.А. Ступин). В качестве критерия оценки эндотоксикоза нами выбран лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), рассчитываемый по формуле Кальф-Калифа [5]. Показатели суммарной электрической активности и ЛИИ представлены в виде медианы. Корреляционный анализ между суммарной электрической активностью (мощностью) ЖКТ и ЛИИ выполнен с использованием непараметрического рангового критерия Спирмена. Достоверность различий между показателями определяли с использованием непараметрического рангового критерия для множественных групп Крускала — Уоллиса.

Таблица 1
Распределение больных по тяжести течения
распространенного перитонита и летальности

Степень тяжести	n	%	Летальность	
			n	%
Первая (менее 20 баллов)	8	36,4	0	0
Вторая (20-30 баллов)	7	31,8	5	71,4
Третья (более 30 баллов)	7	31,8	5	71,4
Всего	22	100	10	45,5

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе полученных данных оказалось, что суммарная электрическая активность (мощность) у больных первой группы составила 44,9 мВ, у больных второй группы — 30,1 мВ, и у больных третьей группы — 40,0 мВ. Достоверных различий между вышеуказанными показателями

Таблица 2
Распределение больных по причине возникновения
распространенного перитонита

Основной диагноз	Всего		Умерло	
	n	*, %	n	%
Острый аппендицит	4	18,2	0	0,0
Травма живота с повреждением органов брюшной полости	1	4,5	0	0,0
Острый деструктивный панкреатит	5	22,7	4	80,0
Спаечная болезнь органов брюшной полости	4	18,2	0	0,0
Мезентериальный тромбоз	4	18,2	4	100,0
Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1	4,5	0	0,0
Послеоперационный перитонит	1	4,5	1	100,0
Рак толстой кишки, осложненный перфорацией	1	4,5	0	0,0
Ущемленная диафрагмальная грыжа с некрозом толстой и тонкой кишок	1	4,5	1	100,0
Всего	22	100	10	50,0

нами не выявлено, что, вероятно, свидетельствует о независимом влиянии пареза кишечника на степень тяжести течения перитонита. При анализе результатов степени интоксикации по ЛИИ, оказалось, что у больных первой группы этот показатель был равен 2,9, у больных второй группы — 5,5 и у больных третьей — 3,2. Причем, выявлена значимая достоверность различий между этими показателями, критерий Крускала — Уоллиса составил 11,7 при $p = 0,003$. Полученные данные позволяют предположить, что при среднетяжелом течении перитонита наблюдается более выраженная интоксикация, вероятнее всего связанная с провоспалительной реакцией, в то время как при тяжелом течении распространенного перитонита она становится мало контролируемой. Учитывая характер выявленных изменений, нами проведен корреляционный анализ зависимости между выраженностью электрической активности и степенью интоксикации в сформированных группах. Оказалось, что у больных первой группы отмечена слабая отрицательная корреляционная связь (коэффициент Спирмена $(-0,2)$, $p = 0,26$), у больных второй группы зависимости между показателями не выявлено, в третьей группе отмечена слабая отрицательная корреляционная связь (коэффициент Спирмена $(-0,1)$, $p = 0,7$). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о выраженном влиянии пареза ЖКТ на степень эндотоксикоза, который наблюдается при легкой и тяжелой степени тяжести течения перитонита. При легкой степени тяжести течения перитонита эта зависимость носит защитный характер, в то время как при тяжелой степени тяжести течения РП эта особенность может быть интерпретирована, как усугубление развивающейся энтеральной недостаточности. Учитывая полученные данные, нами введен коэффициент выраженности пареза (Кп), отражающий степень тяжести пареза ЖКТ в зависимости от степени эндотоксикоза. Он представляет собой частное из отношения ЛИИ к суммарной электрической активности, регистрируемой при выполнении периферической электрогастроэнтерографии (заявка № 2004119999/14 (021475) на изобретение. Приоритет от 30.06.2004). В связи с этим, был рассчитан Кп в группах исследуемых больных. У больных первой группы он составил 0,0; у больных второй группы Кп был равен 0,2 и у больных третьей группы — 0,1. Исходя из этого, можно предположить, что при легком течении распространенного перитонита проявления метаболических нарушений, связанных с парезом ЖКТ, носят обратимый защитный характер, в то время как при перитоните средней и тяжелой степени тяжести, данные проявления являются патологическим звеном развития энтеральной недостаточности.

ВЫВОДЫ

Сочетанное применение периферической электрогастроэнтерографии с оценкой лейкоцитарного индекса интоксикации позволяет достоверно оценить степень тяжести поражения ЖКТ у больных распространенным перитонитом

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаин Ю.М. Синдром энтеральной недостаточности при перитоните: теоретические и практические аспекты, диагностика и лечение / Ю.М. Гаин, С.И. Леонович, С.А. Алексеев. — М., 2001. — 265 с.
2. Галеев Ю.М. Сравнительное исследование бактериальной транслокации в условиях экспериментального перитонита методом динамической гамма — сцинтиграфии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Иркутск, 2001. — 23 с.
3. Гальперин Ю.М. Парезы, параличи и функциональная непроходимость кишечника / Ю.М. Гальперин. — М.: Медицина, 1975. — 219 с.
4. Гейбуллаев А.А. Электроэнтерография при ведении больных с послеоперационной динамической кишечной непроходимостью и перитонитом / А.А. Гейбуллаев // Анналы хирургии. — 2000. — № 1. — С. 69—73.
5. Кальф-Калиф Я.Я. Олейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении. / Я.Я. Кальф-Калиф // Врачебное дело. — 1941. — N 1. — С. 31—35.
6. Нотова О.Л. Оценка моторной деятельности желудка и различных отделов кишечника по данным периферической полиэлектрографии: Дис. ... канд. мед. наук. — М., 1987. — 271 с.
7. Попова Т.С. Синдром кишечной недостаточности в хирургии / Т.С. Попова, Т.Ш. Тамазашвили, А.Е. Шестопалов. — М.: Медицина, 1991. — 238 с.
8. Салия Н.Т. Периферическая полиэлектрография в оценке нарушений двигательной активности желудочно-кишечного тракта при острой кишечной непроходимости: Дис. ... канд. мед. наук. — Тбилиси, 1987. — 218 с.
9. Современные представления о классификации перитонита и системах оценки тяжести состояния больных / В.Д. Федоров, В.К. Гостищев, А.С. Ермолов, Т.Н. Богницкая // Хирургия. — 2000. — № 4. — С. 58—62
10. Хирургические инфекции: Руководство / Под ред. И.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. — СПб.: Питер, 2003. — 864 с.
11. Chance DeWitt R. The gut role in metabolism, mucosal barrier function, and gut immunology / R. Chance DeWitt // Infectious Disease Clinics of North America. — 1999. — Vol. 13, N 1999. — P. 465—481.
12. Todd J. Morris Gut protection: why and how? / J. Todd // Critical Care Medicine. — 2001. — Vol. 29, N 8. — P. 258—263.