

ID: 2013-03-257-T-2470

Тезис

Мусаелян Е.А.

Дифференциальная диагностика миомы матки с субмукозной локализацией и полипа эндометрия.*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии**Научный руководитель: заведующая кафедрой, д.м.н., профессор Чехонацкая М.Л.*

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению количества больных женщин с патологией эндометрия и с миомой матки с субмукозной локализацией. Эти пациентки составляют основной контингент гинекологических стационаров, где подвергаются неоднократным лечебно-диагностическим, хирургическим и медикаментозным воздействиям, а в некоторых случаях и радикальным операциям вследствие рецидивирующих маточных кровотечений и стойкого болевого синдрома. Существует также тесная взаимосвязь между проблемой бесплодия и миомой матки с субмукозной локализацией, причем у 20% бесплодных женщин миома является единственной патологией репродуктивной системы.

Цель: рассмотреть случаи дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией от полипа эндометрия на конкретных примерах.

Материалы: случаи дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией от полипа эндометрия на примерах исследования женщин различных возрастов от 20 до 65 лет.

Используемые методы: ультразвуковое исследование.

Результаты: рассмотрены случаи дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией и полипов эндометрия на конкретных примерах, отмечены особенности дифференциальной диагностики.

Таким образом, вопросы дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией узлов и полипов эндометрия не теряют своей актуальности, так как в большинстве случаев обе патологии, являющиеся показанием к хирургическому лечению, вследствие выраженной клинической картины: длительных, обильных менструаций и метроррагий, анемизирующих пациентку, болевого синдрома, бесплодия и не вынашивания беременности, но отличается объемом оперативного лечения.

Увеличение частоты встречаемости различных патологий эндометрия делает неизбежным совершенствование методов диагностики. А недостаточная изученность вопросов дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией от полипов эндометрия на дохирургическом этапе обуславливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса.

Ключевые слова

дифференциальная диагностика, субмукозная миома матки