

ID: 2013-02-257-T-1962

Тезис

Пышкина Т.В., Новичков Д.А., Турищева М.А., Аристанбекова М.С.

Факторы риска во время беременности и в родах у женщин с ВИЧ-инфекцией*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета**Научный руководитель: к.м.н., асс.Суворова Г.С.*

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции у беременных женщин во многом определена общностью эпидемиологических, социальных и экономических показателей. Риск перинатального инфицирования зависит от многих факторов.

Цели и задачи: Оценить степень влияния факторов риска на течение беременности у ВИЧ-инфицированной женщины для более точной оценки состояния здоровья будущего ребенка.

Материалы и методы: Проведен анализ амбулаторных карт 115 ВИЧ-инфицированных женщин, родивших детей в период январь-май 2012 года.

Результаты: Средний возраст матерей составил 22,9 года. Отрицают наличие вредных привычек – 22,3% человек, табакокурение – 10%, потребление ПАВ и алкоголя – 6% человек. У 100% женщин выявлены в анамнезе инфекции, среди которых хронические специфические инфекции – 45% (50,9%- токсоплазмоз, 35,4%- сифилис, 13,7%- туберкулез легких). Заболевание ССС – у 16%, заболевание почек – 10%, заболевание – 3%, анемию во время беременности – у 76,5%, заболевание глаз (миопия) – 6,1%. Аборты перед первыми родами у 20% женщин, перед вторыми родами у 3%. Осложнение беременности: токсикоз беременных у 7%, гестоз второй половины беременности у 24,4%, УПБ – 30%, ХВГП – 29%, ФПН – 11%, ЗРП – 3%. Преждевременные роды у 15% женщин. Роды путем операции кесарева сечения – 22%. Низкие начальные темпы прибавки массы и роста отмечались у 42,1% детей. Чаще всего отмечалась задержка внутриутробного развития плода по гипотрофическому типу. Постгипоксическое поражение ЦНС различной степени тяжести отмечалось у 90,5% детей. Гематологические сдвиги в виде анемии легкой и средней степени тяжести у 97,3% детей.

Выводы:

1. 60% женщин родивших в период с начала 2012 года входят в группу высокого риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции;
2. Наличие высокой группы риска требует более тщательного подхода к ведению беременных с ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова

группа высокого риска, ВИЧ-инфекция