

И.А.Частоедова
Кировская государственная медицинская академия

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

При воздействии различных патогенных факторов параллельно нарушается и морфофункциональное состояние биотипа и количественно-качественный состав микрофлоры (Пайков В.Л., 1999). У детей раннего возраста дисбактериозы связаны с несовершенством защитных реакций организма, в том числе, с факторами риска, которым подвергается ребенок с момента рождения.

Цель и задачи исследования: проанализировать факторы, способствующие развитию дисбактериоза кишечника у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования: оценка состояния микробиоценоза кишечника проводилась по результатам бактериологического исследования кала (определение удельного веса отдельных представителей кишечной микрофлоры путем приготовления стандартной фекальной взвеси и последующего посева на ряд дифференциально-диагностических сред).

Анализ клинической картины у 78 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с нарушенным микробиоценозом (дисбактериоз I степени у 59 детей, дисбактериоз II степени у 19 детей) показал, что с наибольшей частотой при дисбактериозе кишечника встречался аллергический синдром (76 % обследованных детей). Реже регистрировались синдром поражения ЖКТ (17 % детей) и инфекционный синдром (7 % детей).

При изучении факторов, способствующих развитию дисбиоза, выявлено, что отягощенный аллергологический анамнез имели 14 % обследованных, отягощенный акушерский - гинекологический анамнез -

большинство детей. Чаще всего отмечались: угроза прерывания беременности - у 45 % матерей, воспалительные заболевания мочеполовой системы - у 33 % матерей, анемия I степени - у 17 %. У 35 % матерей обследованных детей регистрировались нарушения родовой деятельности.

У большинства (55 %) обследованных детей отмечалась перинатальная энцефалопатия.

Таким образом, при оценке риска возникновения дисбиоза у детей раннего возраста необходимо учитывать данные анамнеза.