5. Николаев Е.В., Убиенных Н.В., Хромова Н.В. и др. Пути улучшения отдаленных результатов хирургического лечения больных ожирением // *Анналы хирургии*. Приложение. – 30 июня – 2 июля 2011 г. Калининград. – С. 46–47.

6. Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения. – СПб., 2007. – С. 176–250.

7. Brannon Hubbard T. The prevention of bypass enteritis after jejunioleal bypass for morbid obesity // *Annals of Surgery*. – Vol. 6. – 1978. – P. 502–511.

8. Bjernekleit A., Viddal K.O., Midtvedt T. Intestinal and gastric bypass. Changes in intestinal microecology

after surgical treatment of morbid obesity in man. *Scand J. Gastroenterol.* – 1981. – P. 681–688.

9. Chalstrey L.J., Winder A.F., Galton D.J. Partial ileal bypass in treatment of familial hypercholesterolaemia // *Journal of the Royal Society of Medicine*. – Vol. 75. – 1982. – P. 851.

10. Corrodi P. Jejunioleal bypass: change in the flora of the small intestine and its clinical impact // *Rev Infect Dis*. – 1984. – № 6. – P. 80–84.

11. Feinberg S.B., Schwartz M.Z., Clifford S. et al. Significance of pneumatosis cystoides intestinalis after jejunioleal bypass // *The American Journal of Surgery*. – Vol. 133, Issue 2, 1977. – P. 149–152.

Координаты для связи с авторами: Убиенных Николай Валерьевич – врач-хирург городской больницы № 11, e-mail: muz_sv11@medadmin.info; Ташкинов Николай Владимирович – доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой хирургии с курсом эндоскопической и пластической хирургии ДВГМУ, тел. 8-(4212)-32-63-93, e-mail: nauka@mail.fesmu; Бояринцев Николай Иванович – доктор мед. наук, профессор кафедры хирургии с курсом эндоскопической и пластической хирургии ДВГМУ, тел. 8-(4212)-32-63-93, e-mail: nauka@mail.fesmu; Убиенных Валерий Владимирович – канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной хирургии ДВГМУ, тел. 8-(4212)-32-63-93, e-mail: nauka@mail.fesmu; Сучков Александр Васильевич – врач-хирург городской больницы № 11, e-mail: muz_sv11@medadmin.info.

УДК 616.711-002.5

А.А. Вишнеvский, С.В. Бурлаков, В.В. Олейник, А.Н. Макаровский, Е.В. Решетнева, С.С. Назаров

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА

СПб НИИ фтизиопульмонологии,

194354, пр-т Луговский, 2, тел. 8-(812)-606-65-74, e-mail: spbniif_all@mail.ru, г. Санкт-Петербург

Резюме

Проведена ретроспективная оценка хирургического лечения 364-х больных туберкулезным спондилитом, которым выполнена 451 операция. Имевшие место послеоперационные осложнения разделены на ранние и поздние. Их частота составила 11,8 % от всех проведенных операций. Ранние послеоперационные осложнения были представлены нозокомиальной инфекцией. Поздние осложнения ТС в основном были связаны с несостоятельностью переднего спондилодеза или дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночнике вследствие нарушения его биомеханики и прогрессированием специфического процесса. Анализ полученных результатов выявил зависимость количества осложнений от сроков выявления заболевания и времени проведения оперативного вмешательства. Доказана целесообразность раннего оперативного вмешательства туберкулезного спондилита с целью предупреждения послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: туберкулез, спондилит, осложнения операций.

A.A. Vishnevskiy, S.V. Burlakov, V.V. Oleynik, A.N. Makarovskiy, E.V. Reshetneva, S.S. Nazarov

THE ANALYSIS OF THE FACTORS COMPLICATING SURGICAL TREATMENT OF TUBERCULOSIS SPONDYLITIS

S-Petersburg Scientific Institute of Phthisiopulmonology, Department of the Spine Surgery, S-Petersburg

Summary

The retrospective estimation of surgical treatment of 364 patients with tuberculosis spondylitis is presented. Frequency of early and late complications of surgical treatment comprised 11,8 % of all the operations performed. The analysis of the received results revealed dependence of amount of complications on terms of disease diagnostics, timing of operative

Рис. 2. Влияние длительности заболевания ТС на количество послеоперационных осложнений ($p=0,025$)

Рис. 3. Влияние распространенности ТС на количество послеоперационных осложнений ($p=0,05$)

Наличие распространенных и осложненных форм ТС значительно увеличивает риск послеоперационных осложнений [1]. В 17-ти случаях (3,8 % от всех выполненных операций) имело место прогрессирование специфической инфекции. В основном это были пациенты с полисегментарными или многоуровневыми формами ТС. Возможными факторами, определяющими эти осложнения, были состояние системного и местного иммунитета, а также вирулентность возбудителя и высокая частота устойчивости МБТ к лекарственным препаратам [10, 11, 12]. Ранее было показано [2], что обострение специфического процесса в позвоночнике достоверно чаще определялось у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью МБТ. Исследование местного иммунитета не являлось задачей настоящего исследования, однако можно предположить, что клеточный иммунодефицит при ТС, наряду с повышением параметров естественной резистентности, может явиться одной из причин развития этого заболевания [5].

В проведенном исследовании более половины послеоперационных осложнений было обусловлено нарушением опорной функции позвоночника вследствие несостоявшегося костного блока после проведенной костной пластики, что согласуется с данными других авторов [4, 9]. Из ортопедических осложнений чаще встречалась резорбция аутоотрансплантата – 10 случаев или же сегментарная нестабильность – 8 случаев. Клинические симптомы прогрессирования заболева-

ния при этом отсутствовали. Причинами других осложнений были нестабильность металлоконструкций, перелом аутоотрансплантата, вывих аутоотрансплантата (по 2 случая).

Нарастание деформации позвоночника на фоне нестабильности, обусловленной смещением трансплантатов и фиксирующих элементов конструкций, приводило в ряде случаев к дегенеративным изменениям позвоночника (стенозированию позвоночного канала, формированию грыж межпозвонкового диска выше или ниже места спондилодеза). Это обусловлено тем, что при использовании трансплантатов увеличиваются нагрузки на смежные ПДС на 20-30 %. У 2-х больных имелся болевой синдром на фоне «болезни поражения подлежащего уровня» (БППУ), а в 1-м случае – стеноз позвоночного канала. Для решения этой проблемы были использованы этапные методики лечения, позволяющие комбинировать передние и задние подходы к позвоночнику, в 2-х случаях использованы динамические системы фиксации, а в 1-м – ламинэктомия в сочетании с задней транспедикулярной фиксацией.

Анализ полученных результатов выявил зависимость количества осложнений от сроков выявления заболевания и времени проведения оперативного вмешательства. Ранние послеоперационные осложнения были представлены нозокомиальной инфекцией, поздние – ортопедическими проблемами вследствие несостоятельного переднего спондилодеза или дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночнике из-за нарушения его биомеханики и прогрессированием специфического процесса на фоне лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза. Таким образом, проведенное исследование показало, что причинами неэффективности операций по поводу туберкулезного спондилита могут быть:

- позднее выявление заболевания и неоправданно длительное консервативное лечение;
- осложненные формы спондилита;
- осложнения, возникающие во время операции;
- ошибки выбора объема проводимого хирургического лечения (неполноценное удаление гнойного очага и абсцесса, неполная декомпрессия нервных структур во время операции;
- неадекватная стабилизация во время операции и сохраняющаяся нестабильность ПДС после проведенной операции.

Выводы

1. Операционные осложнения встречались в 11,8 % от всех выполненных операций. Наиболее частыми были поздние послеоперационные осложнения.
2. Наличие распространенных и осложненных форм туберкулезного спондилита приводят к необходимости многоэтапного хирургического лечения.
3. Доказана зависимость возникающих послеоперационных осложнений от формы течения ТС и длительности заболевания.
4. С целью предупреждения послеоперационных осложнений необходима своевременная диагностика и ранние оперативные вмешательства.

Литература

1. Бурлаков С.В., Олейник В.В., Гусева В.Н. и др. Ближайшие и отдаленные осложнения после операций, проведенных по поводу туберкулезного спондилита // Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом: тезисы научно-практ. конференции. – СПб., 2011. – С. 285–286.
2. Васильева Г.Ю., Журавлев В.Ю., Соловьева Е.В. и др. Роль молекулярно-генетических методов в диагностике туберкулезного спондилита // Инновационные технологии в организации фтизиатрической и пульмонологической помощи населению: тезисы научно-практ. конф. – СПб., 2011. – С. 81.
3. Гарбуз А.Е., Тиходеев С.А., Олейник В.В. Костная пластика при ограниченных формах туберкулезного спондилита // Пробл. туберкулеза. – 1991. – № 1. – С. 38–51.
4. Гарбуз А.Е., Гусева В.Н., Якименко Д.В. Передний спондилодез углерод-углеродными имплантатами при заболеваниях позвоночника // Туберкулез в северо-западном регионе России: современные проблемы: науч. труды СПбНИИФ. – СПб., 2001. – С. 98.
5. Керко О.В., Гусева В.Н., Потапенко Е.И., и др. Роль иммунологических показателей при туберкулезе и остеомиелите позвоночника // Медицинская иммунология. – 2005. – № 2-3. – С. 243–244.
6. Куклин Д.В. Задняя инструментальная фиксация позвоночника при туберкулезном спондилите и гематогенном остеомиелите позвоночника: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб., 2005. – 19 с.
7. Мирзоев С.О., Сулайманов И.И., Юсупов Е.Ю. и др. Радикальное хирургическое лечение осложненных форм туберкулеза поясничного отдела позвоночника // Науч. тр. всерос. науч. практ. конф. – СПб., 2008. – С. 153.
8. Назаров С.С., Олейник В.В. Влияние лекарственных устойчивых МБТ на распространенность и течение туберкулезного спондилита // Материалы всерос. науч. практ. конф. – СПб., 2010. – С. 218.
9. Олейник В.В. Результаты хирургического лечения туберкулезного спондилита при генерализованном туберкулезе // Мониторинг. Выявление. Диагностика. Лечение туберкулеза. – Екатеринбург, 2004. – С. 143–145.
10. Перецманас Е.О. Причины появления инвалидизирующих форм туберкулезного спондилита // Проблемы туберкулеза. – 2002. – № 8. – С. 6–7.
11. Перецманас Е.О., Лавров В.Н., Салтыкова М.Е. Ошибки и сложности в диагностике туберкулезных спондилитов // Науч. тр. всерос. науч. практ. конф. – СПб., 2006. – С. 151.
12. Потапенко Е.И., Васильева Г.Ю., Якунова О.А. и др. Иммунологические аспекты костно-суставного туберкулеза, осложненные лекарственной устойчивостью к штаммам микобактерии туберкулеза // Мед. имун. – 2009. – Т. 11, № 4-5. – С. 394–395.

Координаты для связи с авторами: Вишневецкий Аркадий Анатольевич – доктор мед. наук, руководитель отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, тел. +7-921-753-14-90, e-mail: vichnevsky@mail.ru; Бурлаков Сергей Владимирович – старший научный сотрудник отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, канд. мед. наук, e-mail: burlakovsv@mail.ru; Олейник Владимир Васильевич – доктор мед. наук, старший научный сотрудник отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, e-mail: spbniif_all@mail.ru; Макаровский Андрей Николаевич – доктор мед. наук, старший научный сотрудник отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, e-mail: spbniif_all@mail.ru; Решетнева Евгения Викторовна – аспирант отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, e-mail: evgesha_1000@mail.ru; Назаров Сергей Сергеевич – младший научный сотрудник отдела фтизиовертебрологии СПб НИИФ, e-mail: sergejnaz@mail.ru.