

Терапия

ID: 2012-11-8-T-1725

Тезис

Коньшина Л.Е., Леонтьев М.А., Рыжкова Е.Ю., Соколов И.М., Гафанович Е.Я., Железнякова Н.А., Конобеева Е.В.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и патология двенадцатиперстной кишки

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Изучение потенциальных взаимосвязей между наличием заболеваний, связанных с *Helicobacter pylori* (Нр), и развитием/тяжестью гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) является важной проблемой современной гастроэнтерологии.

Цель исследования. Установить взаимосвязи между наличием язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), ассоциированной с Нр, хронического дуоденита и обнаружением рефлюкс-эзофагита у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта в Хвалынском районе Саратовской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 2357 пациентов, обращавшихся за медицинской помощью в центральную районную больницу данного региона. Средний возраст обследованных пациентов составил $52 \pm 1,8$ лет. Всем больным была проведена фиброэзофагогастродуоденоскопия, при выявлении патологии двенадцатиперстной кишки (ДПК) выполнялась биопсия, а также тест на наличие Нр.

Результаты исследования. Частота диагностики Нр при ЯБДПК среди наших пациентов не отличалась от данных литературы и составила 85,6 %. На основании полученных коэффициентов корреляции была установлена достоверная обратная взаимосвязь между наличием ЯБДПК и рефлюкс-эзофагитом. У пациентов, страдающих ЯБДПК, рефлюкс-эзофагит обнаруживался только у 11,42%. Среди тех, у кого не обнаружен язвенный дефект ДПК рефлюкс-эзофагит констатирован в 19,28% случаев. Аналогичная достоверная ассоциация выявлена в случае наличия дуоденита: на его фоне у 12,35% человек встречался рефлюкс-эзофагит, в группе без дуоденита эзофагит выявлялся в 20,99% случаях.

Выводы. На фоне имеющегося дуоденита, или ЯБДПК, ассоциированной с Нр, частота выявления рефлюкс-эзофагита почти в два раза ниже по сравнению с группой обследованных, не имеющих патологии двенадцатиперстной кишки. Это может свидетельствовать о потенциальной протективной роли Нр в отношении развития ГЭРБ.

Ключевые слова: *Helicobacter pylori*, язва, рефлюкс-эзофагит