

ГРУППА КРОВИ КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.В. ЯНЧЕНКО

*Саратовский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской хирургии и онкологии, г. Саратов*

Актуальность. Рак молочной железы занимает ведущее место среди злокачественных опухолей у женщин. Показатели заболеваемости за последние 20 лет выросли на 40 % и продолжают тенденцию к росту. Давно установлены ведущие факторы, влияющие на прогноз данной патологии.

Цель исследования. Определить особенности группы крови при клинической характеристике больных раком молочной железы.

Материал и методы. Материалом исследования послужил проведенный ретроспективный анализ историй болезни 150 больных раком молочной железы, получавших лечение с 2007 по 2009 г. Преобладали женщины в возрасте от 40 до 60 лет (69 %). Во всех случаях проводилось комплексное лечение, в том числе хирургическое, и получена гистологическая верификация диагноза.

Результаты. Локализация опухоли в правой и левой молочной железе распределилась приблизительно поровну. При дальнейшем исследовании установлено: основную группу (около 70 %) составили пациентки с А(II) группой крови. В дальнейшем, при детальном рассмотрении оказалось, что имеется четкая ассоциация

между локализацией опухоли и группой крови. Выявлено, что у женщин с А(II) группой крови в 63 % в наблюдений опухоль преимущественно располагалась в левой молочной железе и у 71 % из них занимала верхне-наружный и центральный квадранты, наиболее частой гистологической структурой являлся инфильтрирующий протоковый рак II степени злокачественности (59 %). Пациенток с О(I) группой крови было 22 %. У них выявлено, что опухоль в 75 % локализовалась в верхне-наружном квадранте, чаще (65 % случаев) в правой молочной железе. Наиболее частой гистологической формой являлся протоковый рак II степени злокачественности. Больных с В(III) – 8 % и АВ(IV) группами крови – 7 %, локализация в правой и левой молочных железах распределилась приблизительно одинаково. Гистологическая структура в этой группе наиболее часто была в виде инфильтрирующего протокового рака II–III степени злокачественности.

Выводы. По результатам исследований можно сделать вывод, что группа крови имеет определенную ассоциацию с локализацией опухоли в молочной железе.