

Н.М. Гоголев ¹, М.М. Винокуров ², В.В. Савельев ^{4, 1}, А.Ф. Потапов ³**ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМ ПЕРИТОНИТОМ**¹ Кафедра хирургических болезней и стоматологии ИПОВ СВФУ (Якутск)² Кафедра факультетской хирургии, урологии, онкологии и оториноларингологии МИ СВФУ (Якутск)³ Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом скорой медицинской помощи ИПОВ СВФУ (Якутск)⁴ ГУ Республиканская больница № 2 – ЦЭМП (Якутск)**ВВЕДЕНИЕ**

Несмотря на прогресс и успехи современной хирургии перитонит продолжает оставаться самым частым и опасным осложнением острых хирургических заболеваний и повреждений органов брюшной полости. Средние показатели летальности удерживаются на уровне 20 – 30 %, а при послеоперационном перитоните достигают 40 – 50 %. Летальность при тяжелом сепсисе остается очень высокой, достигая 50 % случаев.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В представленной нами работе приведены результаты анализа данных лечения хирургических больных за период с 2001 – 2010 гг., находившихся на лечении в ГУ РБ № 2 ЦЭМП (далее по тексту Центр) по поводу различных заболеваний и травм, осложненных вторичным перитонитом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего за указанный временной период в связи с различными заболеваниями и травмами, осложненными вторичным перитонитом было проведено лечение 1015 пациентам. 647 из них – это мужчины, что составило 63,8 % от общего числа, 368 – женщины (36,2 %). Таким образом, соотношение мужчин к женщинам – 3:1. Возрастной состав пациентов был очень разнообразным – от 15 до 83 лет. Но основную группу представили пациенты в возрасте до 45 лет – 534 человек (52,6 %), в возрасте от 46 до 55 лет было зарегистрировано 278 человек, что составило 27,4 % от общего количества пациентов, страдающих вторичным перитонитом.

Наиболее часто лечение проводилось городским жителям – 769 человек (75,8 %).

При изучении социального статуса пациентов было установлено, что наибольшее количество пациентов – это работающие – 443 человека (43,7 %), безработных пациентов было зарегистрировано 292 человека (28,7 %), пенсионеров – 198 (19,5 %), учащихся – 82 (8,1 %) человек.

716 (70,5 %) пациентов поступивших на лечение в Центр экстренной медицинской помощи доставлены Скорой медицинской помощью, были направлены из ЛПУ г. Якутска – 139 (13,7 %), доставлены санитарной авиацией из центральных районных больниц республики – 96 (9,5 %) человек, обратилось в Центр самостоятельно – 64 (6,3 %) человек.

Все больные госпитализированы по экстренным показаниям через различное время с момента заболевания или травмы: через 6 часов – 519 (51,1 %), от 6 часов до суток – 334 (32,9 %) и более суток 162 (16 %).

Большинству больных – 897 (88,4 %) человек была проведено по одному оперативному вмешательству, при этом летальность составила 4,8 %. При повторных операциях проведенных 118 (11,6 %) пациентам, летальность составила 62,5 %. Общая летальность составила 12,6 % по отношению ко всем больным с разлитым перитонитом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате проведенного анализа данных среднестатистический пациент с разлитым вторичным перитонитом – это мужчина трудоспособного возраста до 55 лет, житель города. Обращение за медицинской помощью происходит в течение суток. Операция проводится по экстренным показаниям чаще всего один раз. 85,4 % оперированных пациентов выписывается из стационара в удовлетворительном состоянии. Летальность у пациентов с разлитым вторичным перитонитом составила 13,3 % от общего количества пациентов с разлитым перитонитом.