

ID: 2013-02-8-T-2238

Тезис

Бичурина Д.М., Чернова Ю.В.

Характеристика пациентов с системным амилоидозом*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета**Научный руководитель: к.м.н., ассистент Волошинова Е.В.*

Амилоидоз – группа заболеваний с разнообразием клинических проявлений, вызванных системным или локальным отложением в межклеточной ткани фибриллярных белковых масс, имеющих общую физическую структуру. Наиболее распространены AA- и AL-формы системного амилоидоза, протекающие с вовлечением в патологический процесс многих органов, в первую очередь – почек.

С 2007 года на базе нефрологического отделения Областной клинической больницы г. Саратова ведется учет больных с амилоидозом. Количество обследованных - 59 человек. Средний возраст пациентов - 52,7 года: мужчин - 30 человек, женщин – 28 человек. AL-амилоидоз отмечался у 17 человек (28,8%), AA-амилоидоз – у 42 (71,2%). Средний возраст больных AL-формой составил 53,6 года, AA-формой – 52,6 года. Поражение почек встречалось в 100% случаях. Частота нефротического синдрома при AL-амилоидозе составила 88,2%, при AA-амилоидозе – 71,4%. У 6 пациентов AL- амилоидоз сформировался в рамках множественной миеломы.

У большинства пациентов с AL-амилоидозом (41,2%) на момент установления диагноза констатирована 3 стадия хронической болезни почек (ХБП), у больных с AA-амилоидозом у большинства (40,5%), диагноз выставлен на 5 стадии ХБП, на 2 и 3 стадии – у 13 % (по 8 пациентов) при каждой стадии.

Поражение органов желудочно-кишечного тракта при AL-амилоидозе встречалось в 47,1% случаев, при AA-амилоидозе - в 38,1%. Увеличение размеров печени по данным УЗИ встречались примерно с одинаковой частотой: в 47,1% и 40,5% случаев при AL- и AA-формах соответственно. Частота поражений сердца при с AL-амилоидозе значительно выше (41,2%) , чем при AA (9,5%).

Гипертония при AA-типе встречалась у 61,9% пациентов, при AL- типе - у 70,6%. При AA-амилоидозе гипотония отмечалась у 5 пациентов из 42, при AL- амилоидозе - у 4 из 17.

Выводы. По данным нашего наблюдения установлено, что системный амилоидоз встречается практически с одинаковой частотой у мужчин и женщин. Наиболее распространенной является AA-амилоидоз, при этом AL-форма не является эксклюзивной. Средний возраст пациентов с AL- амилоидозом существенно меньше, чем это принято считать. Обращает внимание диагностика обеих форм амилоидоза на поздних стадиях ХБП, что свидетельствует о недостаточной информированности врачей в отношении этой формы патологии.

Ключевые слова

амилоидоз