

ID: 2013-02-231-T-2091

Тезис

Спицына М.Ю., Попова С.В.

Изучение влияния соматической патологии на течение беременности и роды*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права**Научный руководитель: к.м.н., доцент Сазанова Г.Ю.*

Актуальность проблемы. Рождение здорового поколения—одна из приоритетных проблем в здравоохранении. Частыми заболеваниями у женщин детородного возраста, приводящими к осложнениям течения беременности и родов, являются болезни мочевыделительной системы, системы кровообращения, воспалительные заболевания женской половой системы.

Цели: выявить закономерности возникновения осложнений в период беременности и родов от наличия соматических заболеваний мочевыделительной, половой систем и системы кровообращения в родильных домах города Балашова и Тамбовской области.

Задачи: выяснить зависимость развития осложнений в родах у беременных женщин, имеющих соматическую патологию, по данным историй родов и обменных карт родильных домов Саратовской и Тамбовской областей за период 2010-2011 г.

Результаты: среди городского населения Тамбовской области заболеваемость артериальной гипертензией беременных женщин от 15 до 20 лет составила 34%, от 21 до 25 лет – 30%, от 26 до 30 лет – 36%. В Саратовской области-34%, 31%, 35%. В сельской местности в Тамбовской области частота заболеваемости беременных женщин артериальной гипертензией в данных возрастных группах составила 36%, 33%, 31%. В Саратовской области – 35%, 32%, 33%. У беременных женщин городской местности Тамбовской области частота заболеваемости хроническим пиелонефритом в возрасте от 15 до 20 лет составила 41%, от 21 до 25 лет –24 %,от 26 до 30 лет- 15%, а старше 31 года -20% . В Саратовской области-38%, 21%, 17% и 24%. В структуре заболеваемости хронический пиелонефрит у беременных женщин сельской местности Тамбовской области в возрастных группах от 15 до 20 лет составил 15% , от 21 до 25 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 21% и старше 31 года – 47% . В Саратовской области у беременных женщин, проживающих в сельской местности-18%, 22%, 20%, 40%. Среди городского населения в обоих регионах заболеваемость хроническим аднекситом высокая в старших возрастных группах, а среди сельского- в младших возрастных группах.

Выводы: в исследуемых регионах заболеваемость хроническим пиелонефритом занимает первое место, заболеваемость артериальной гипертензией – второе место, заболеваемость хроническим аднекситом – третье место. Отмечается прямая зависимость при возникновении осложнений беременности и родов между ростом заболеваемости мочевыделительной системы и возрастом женщины. У сельского населения заболеваемость мочевыделительной системы в полтора раза выше, чем у городского.

Ключевые слова

беременность, роды, заболеваемость, хронический пиелонефрит