Григорий АРУТЮНОВ, Александр РОЗАНОВ, Российский государственный медицинский университет, Московский факультет, кафедра терапии

Клинические исследования 2002 года —

ОТКРЫТИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Завершился 2002 год. Прошли ежегодные конгрессы Американской ассоциации сердца, Американской коллегии кардиологов, Европейской ассоциации сердца, на которых были доложены результаты исследований, завершившихся в этом году.

И действительно, прошедший год был богат на события, сенсации и разочарования: были доложены результаты исследования LIFE, продемонстрировавшего преимущества терапии антагонистом ангиотензина II в сравнении с другим активным препаратом, не оправдались надежды на большую эффективность АТ-блокаторы в исследованиях OPTIMAL и OVERTURE — антагонисты ангиотензина II вновь оказались не лучше иАПФ в профилактике сердечной недостаточности, а омапатрилат не превзошел эналаприл в лечении пациентов с ХСН. В исследовании ALLHAT лизиноприл оказался менее эффективен в лечении пациентов в сравнении с мочегонным препаратом хлорталидоном. Результаты исследования PRAGUE показали преимущества агрессивной тактики ведения острого инфаркта миокарда в сравнении с тромболитической терапией, в исследовании CARMEN подтвердилось предположение об оптимальности комбинированной терапии ХСН иАПФ (эналаприл) и бета-блокаторами (карведилол) в сравнении с монотерапией этими препаратами. Особый интерес представляли результаты исследований программы CARDINAL — COMMA и COMPLY — первых опытов клинического применения у пациентов антител к компоненту C5 комплемента с целью ограничения зоны некроза и влияния на прогноз и выживаемость больных.

Итак, определились основные векторы научных исследований 2002 г. — лечение острого коронарного синдрома, лечение и профилактика сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и мерцательной аритмии.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Настоящим прорывом в научных изысканиях, завершившихся к 2002 г., стали результаты исследования LIFE — The Losartan Intervention For Endpoint Reduction in

Hypertension Study. Идея сравнения эффективности двух препаратов — «старой» и «новой» генераций — назрела уже давно. Ни для кого не секрет, что снижение артериального давления одинаково хорошо дается и мочегонным, и иАПФ, и антагонистам АП, и антагонистам кальция. ИАПФ и бета-блокаторы обладают доказанным органопротективным действием, эффективно влияя на показатель смертности, как общей, так и сердечно-сосудистой, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, антагонист ангиотензина II лозартан имел достойного соперника — атенолол — в терапии артериальной гипертензии и профилактике наступления смерти или сердечно-сосудистых исходов.

Опубликованные результаты: снижение риска развития первичной конечной точки «сердечно-сосудистая смертность + инсульт + инфаркт» при приеме лозартана в сравнении с атенололом — 13% ($p=0,0021$), снижение риска развития фатального и нефатального инсульта — 24,9% ($p=0,001$). Однако следует особо отметить, что применение лозартана не повлияло на частоту развития инфарктов миокарда и общую смертность в популяции исследования. Еще более эффективным оказался препарат у пациентов с сахарным диабетом — снижение риска развития комбинированной первичной конечной точки на 24,5% ($p=0,031$), риска развития смерти от сердечно-сосудистых причин на 36,6% ($p=0,028$), снижение риска развития смерти от всех причин на 38,7% ($p=0,002$). Следовательно, применение лозартана у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом позволяет реально и существенно изменить клиническую картину течения заболевания, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых исходов, в том числе и смерти, уменьшить число госпитализаций. Кроме того, терапия лозартаном способствовала достоверному, в сравнении с атенололом, уменьшению степени гипертрофии левого

желудочка сердца и размеров левого предсердия, способствуя, таким образом, не только профилактике, но и регрессу процесса ремоделирования миокарда ЛЖ. Немаловажным аспектом представленного исследования является и титрование дозы препарата до 100 мг в сутки в комбинации с гидрохлортиазидом.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Блестяще подтвердились предположения о эффективности комбинированной терапии сердечной недостаточности с помощью иАПФ и бета-блокаторов. Еще в 1999 г. в результатах исследования ELITE-2 при анализе подгрупп исследования особо отмечался выраженный положительный эффект комбинации бета-блокаторов и каптоприла на течение болезни у пациентов с сердечной недостаточностью, вызванной различными причинами. Исследование CARMEN поставило своей целью изучение эффективности и безопасности монотерапии иАПФ эналаприлом, бета-блокатором карведилолом и их комбинацией. Исследование было выполнено на 572 пациентах со стабильным течением ХСН, подобранными дозами мочегонных и дигоксина. Период наблюдения составил 18 месяцев, включая периоды титрации и снижения дозы. Итогом полугодового наблюдения стали следующие результаты:

- ◆ комбинированная терапия иАПФ и БАБ вызывает улучшение функции левого желудочка и регресс процесса ремоделирования;
- ◆ достоверное снижение индекса конечного диастолического объема ЛЖ на фоне комбинированной терапии эналаприлом и карведилолом в сравнении с монотерапией, в первую очередь эналаприлом;
- ◆ различия в эффективности между группами монотерапии иАПФ и бета-блокаторами были недостоверными;
- ◆ все схемы терапии хорошо переносились пациентами.

ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляло исследование TEN-HMS — Trans-European Network — Home Monito-

ring Study. В исследование были включены пациенты с II–IV функциональным классом хронической сердечной недостаточности и ФВ менее 40%, принимающие петлевые диуретики, госпитализированные по причине прогрессирования ХСН, способные выполнить требования протокола. Рандомизация в соотношении 1:2:2 проводилась в группы:

- ◆ обычного врачебного контроля;
- ◆ контроля с помощью телефонных звонков медсестры для осуществления плана ведения пациентов;
- ◆ телемониторингового контроля за состоянием пациента.

Достоверных расхождений в длительности пребывания пациента вне госпиталя между группами сестринского контроля и телемониторингом не получено, однако оба интенсивных способа контроля состояния пациентов привели к достоверным отличиям от группы обычного ведения больных. Полученные данные позволили сформулировать основные выводы из результатов исследования:

- ◆ в сравнении с телефонным контролем телемониторинг не дал достоверных различий во влиянии на смертность и продолжительность внегоспитального периода лечения;
- ◆ телефонный контроль и телемониторинг привели к достоверному снижению смертности и числа госпитализаций в сравнении с обычной тактикой ведения.

Следует особо отметить, что в настоящий момент технологии телемониторинга интенсивно развиваются, что, возможно, в скором времени приведет к изменению стандартов наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью и не только.

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ

Больше вопросов, чем ответов дало завершившееся исследование AFFIRM — Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management. Цель: что эффективнее и безопаснее у пациентов с мерцательной аритмией — контроль ЧСС или восстановление синусового ритма?

Ответ на этот вопрос исследование не дало — не было обнаружено преимуществ в восстановлении синусового ритма в сравнении с контролем ритма препаратами I и III классов антиаритмических средств. Более того, имела тенденция к снижению смертности в течение 5 лет наблюдения в группе эффективного контроля сердечного ритма. Таким образом, восстановление ритма не продемонстрировало достовер-

ного снижения смертности и улучшения качества жизни и снижения риска развития различных исходов, в том числе и инсульта.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

Как всегда, на острие научного поиска находится оптимизация ведения пациентов с острым коронарным синдромом. Принципиально разные проявления заболевания — острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST (инфаркт миокарда) и острый коронарный синдром без элевации сегмента ST (не-Q-инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия) — в результате проведенных исследований получили единый стандарт ведения пациента — предпочтение отдается агрессивной инвазивной тактике лечения.

В исследовании PRAGUE-2 исследовались различные способы ведения пациентов с острой фазой инфаркта миокарда. Изучались группы раннего догоспитального тромболитического, тромболитического по поступлению в госпиталь и транспортировка в стационар для проведения первичного коронарного вмешательства. Следует отметить, что у пациентов до 3 часа болезни достоверной разницы в 30-дневной выживаемости не было получено, однако в группе пациентов от 3 часа болезни появилась достоверная разница между изучаемыми группами. Таким образом:

- ◆ транспортировка в стационар для выполнения первичного коронарного вмешательства эффективна и безопасна;
- ◆ подобное вмешательство более эффективно в сравнении с тромболитической терапией;
- ◆ первичное коронарное вмешательство;
- ◆ средство первого ряда в лечении ОИМ;
- ◆ для пациентов с давностью симптомов более 3 часов предпочтительнее первичное коронарное вмешательство в сравнении с тромболитическим.

Результаты исследований HEROICS и TACTICS также отвели ведущую роль в ведении ОКС инвазивным и агрессивным методом лечения.

Несколько отдельно в ряду исследований острого коронарного синдрома стоят результаты программы CARDINAL — исследования COMMA и COMPLY.

Впервые в клинической практике пациентам вводились антитела к комплементу с целью улучшения выживаемости пациентов на фоне ингибирования процесса воспаления в миокарде после перенесенного инфаркта и, в од-

ном случае, тромболитической терапии (COMPLY), в другом случае — первичного коронарного вмешательства (COMMA). Согласно представленным предварительным результатам, не было получено достоверного различия в размерах некроза на фоне применения препарата в обоих исследованиях. Однако на фоне первичного коронарного вмешательства применение пексилизумаба в режиме болюсного введения препарата + инфузия в сравнении с плацебо привело к достоверному снижению — 2,8% в сравнении с 6,3% ($p=0,019$).

РАЗОЧАРОВАНИЯ

Самые большие разочарования были вызваны публикацией результатов исследований OPTIMAAL (лозартан в сравнении с каптоприлом у пациентов после инфаркта миокарда), OVERTURE (омапатрилат в сравнении с эналаприлом у пациентов с сердечной недостаточностью) и ALLHAT (антигипертензивная терапия).

Большие надежды возлагались на новый препарат — омапатрилат. В течение 2002 г. были доложены результаты 2 исследований с участием препарата — OCTAVE и OVERTURE. К большому сожалению, полученные результаты не оправдали надежд.

Исследование OPTIMAAL еще раз продемонстрировало, что антагонисты ангиотензина II не хуже иАПФ в профилактике развития застойной сердечной недостаточности — 18,2% случаев смерти против 16,4% ($p=0,069$).

К совершенно неожиданным и шокирующим результатам привело окончание исследования ALLHAT. В течение 5 лет 42 418 пациентов, рандомизированно распределенных на 4 группы, принимали тиазидный диуретик хлорталидон, блокатор медленных кальциевых каналов амлодипин, ингибитор АПФ лизиноприл и доксазозин. Терапия доксазозином была досрочно прекращена из-за увеличения числа случаев развития ХСН на 104% и сердечно-сосудистых осложнений на 25%. Конечной точкой была выбрана смерть от коронарной болезни сердца + нефатальный инфаркт миокарда. Другими конечными точками были:

- ◆ общая смертность,
- ◆ любые проявления коронарной болезни сердца,
- ◆ смертельные и несмертельные инсульты,
- ◆ любые сердечно-сосудистые осложнения, включая вошедшие в предыдущие конечные точки + ХСН + заболевания периферических сосудов.

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты сенсационны. По влиянию на первичную конечную точку не было получено достоверных расхождений! При оценке вторичных конечных точек выяснилось, что применение иАПФ не только не оказалось заведомо выигрышным, но и привело к достоверному росту числа инсультов в сравнении с применением мочегонного, в такой важной конечной точке, как рост числа сердечно-сосудистых осложнений, безоговорочным лидером оставался хлорталидон, недостоверное увеличение продемонстрировал амлодипин и, что оказалось полной неожиданностью, лизиноприл увеличивал риск наступления этой конечной точки достоверно — 10% ($p=0,001$). И даже во влиянии на течение ХСН лизиноприл уступил хлорталидону — частота развития декомпенсации ХСН была на 19% ($p=0,001$) выше! Вывод исследования не менее сенсационен — тиазидные диуретики при лечении артериальной гипертензии превосходят блокатор медленных кальциевых каналов амлодипин и иАПФ лизиноприл по влиянию как минимум на одно из главных сердечно-сосудистых осложнений, и при этом они дешевле. Следовательно, тиазидные диуретики должны использоваться как препараты первой линии в лечении артериальной гипертензии.

Следует отдельно отметить, что поражение в исследовании ALLHAT потерпел не класс ингибиторов АПФ, а только один его представитель — лизиноприл. Исходя из этого, следует для каждого препарата определять показания к применению, не руководствуясь класс-специфическими эффектами.

В исследовании OSTATE, выполненном на 25 000 больных с артериальной гипертензией, препаратом сравнения был эналаприл. Титрацию и лечение препаратами проводили в течение 24 недель, конечными точками были выбраны снижение АД с достижением целевого уровня и оценка частоты развития побочных эффектов. При приеме омапатрилата снижение артериального давления в среднем на 3–4 мм рт. ст. встречалось чаще ($p<0,05$), а частота развития ангионевротического отека была достоверно выше — 2,17% против 0,68%. Таким образом, несмотря на свою эффективность, применение препарата, по-видимому, не получит широкого распространения.

По материалам официальных сайтов American Heart Association, American College of Cardiology, European Society of Cardiology и сайтам конгрессов.

Аркадий ВЕРТКИН, Олег ТАЛИБОВ, МГМСУ, кафедра клинической фармакологии

В поисках утраченного времени

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДНИХ

ЛЕТ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ НЕУДАЧЕЙ

Начало любого клинического исследования предусматривает наличие двух гипотез — нулевой и альтернативной. Именно формулировка нулевой гипотезы лежит в основе планирования исследования. Суть ее всегда такова: «предположим, что исследуемые вмешательства не приводят к различным результатам». Дальше все силы исследовательской команды (а эти силы, как правило, немалые) бывают направлены на опровержение этой нулевой гипотезы и доказательство гипотезы альтернативной — «различия есть». Ведь только доказательство последней может привести к громкому успеху, пересмотру существующих представлений, выходу на медицинский рынок новых препаратов, появлению новых лечебно-диагностических концепций.

А бывает и так — альтернативная гипотеза побеждает нулевую... но не совсем в том направлении, в котором хотелось бы. Новое вмешательство оказывается не только не равным старому, но даже хуже него. Две естественные реакции вызывают такой результат. Первая — разочарование. Простой эмоциональный ответ на факт несбывшихся ожиданий и на факт потери сил, времени и спокойствия. Другая реакция — признание факта материального ущерба. Многие исследования, закончившиеся неудачей, — это не просто колоссальные расходы, понесенные спонсором при проведении самого исследования. Это еще и недополученная выгода от возможного выхода на рынок нового лекарственного средства, а порой и отказ от его дальнейшей разработки. Неудачи в исследованиях третьей фазы очень дорого обходятся разработчикам новых лекарств. Мы так устроены, что достижения, новаторство и прогрессорство с точки зрения общества — это успех, а рапорт о них — отчет об успешно проделанной работе. Отказ же от новаций и поддержание консервативных позиций воспринимаются как неудача, а отчет о них порой превращается в тяжелый поиск оправданий.

Если сравнить тон публикаций о тех или иных результатах, подобное ощущение может упрочиться. Тон публикаций о «неуспешных» исследованиях порой кажется

извиняющимся. Результаты же их антиподов публикуются и мультиплицируются в различных изданиях, переводятся на другие языки и включаются в рекламные проспекты. Как правило, причины этого прозрачны — это не только и не столько энтузиазм ликующих исследователей. Это в гораздо большей мере маркетинговая политика производителя. Ведь результат такого исследования, чуть выйдя за пределы «лаборатории», моментально трансформируется из научного достижения в инструмент маркетинговой политики, в «основанную на доказательствах рекламу».

Нет, доказательная база рекламных акций — это отнюдь не плохо. Скорее наоборот. Но сильные плечи спонсоров, маячащие за спинами исследователей, исходно предполагают информационную поддержку только тех результатов, которые «выгодны интересам фирмы».

Вопрос: часто ли мы в России можем прочитать перевод статьи-отчета о результатах «неуспешного» исследования? Или ульшать отчет, посвященный именно таким результатам? Увы, такие отчеты становятся уделом специалистов сугубо в этой области, так как получить доступ к ним можно только путем целенаправленного поиска и отслеживания результатов проходящих исследовательских проектов. Нельзя не упомянуть и о специфичной для России обособленности ее специалистов,