

Войнова Л.В., Макарова М.Р.

*Первый Московский государственный медицинский университет им И.М. Сеченова, кафедра пропедевтики внутренних болезней, г. Москва, РФ*

## ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАРДИИ

**Цель исследования:** изучить эффективность применения антацидного препарата GAVISCON FORTE у больных с недостаточностью кардии.

**Задачи исследования:** уточнить сроки исчезновения таких клинических симптомов недостаточности кардии, как боль в подложечной области, изжога и отрыжка воздухом после приема пищи у больных на фоне стандартного способа применения препарата GAVISCON FORTE. Другие лекарственные препараты не использовались.

**Материалы и методы исследования:** препарат GAVISCON FORTE представляет собой вязкую, непрозрачную суспензию с мятным запахом, содержащую натрия альгинат и калия гидрокарбонат. Антацидное действие препарата снимает проявления гастродуоденального рефлюкса при недостаточности кардии. Всего обследовано 9 больных с недостаточностью кардии, в возрасте от 19 до 35 лет, из них 5 женщин и 4 мужчин. Перед приемом препарата в стандартной дозировке всем пациентам проведено комплексное диагностическое обследование. Гастродуоденоскопическое исследование подтвердило наличие у всех больных недостаточности кардии без патоло-

гии слизистой желудка и 12-ти перстной кишки. Изжога и отрыжка воздухом беспокоили всех больных, а боль в подложечной области отмечали 2 женщины и 1 мужчина. Лабораторные показатели анализов крови и мочи у всех больных были в пределах нормальных значений. Препарат назначался всем пациентам по 10 мл 3 раза в день и перед сном.

**Результаты исследования:** на фоне приема препарата изжога купировалась у всех больных после каждого приема лекарства, отрыжка воздухом исчезла на 5 сутки от начала лечения у 4 больных (3 женщин и 1 мужчины), а у остальных 5 пациентов (2 женщин и 3 мужчин) отрыжка воздухом пропала после недельного приема препарата. Самым последним из вышеперечисленных симптомов исчезла боль в подложечной области: у мужчин она пропала на 10 сутки приема препарата, а у женщин на 16 сутки от начала лечения.

**Выводы:** таким образом, монотерапию препаратом GAVISCON FORTE можно рекомендовать для больных недостаточностью кардии в стандартной дозировке для быстрого снятия болевого синдрома, отрыжки и изжоги.