

УДК 616.24-002.2+616-002.5+16-07-08

Некоторые аспекты диагностики и лечения хронического обструктивного заболевания лёгких на начальных проявлениях его развития

В.В. Килесса

*Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, Симферополь***Ключевые слова:** хроническое обструктивное заболевание легкого, пульмопротекция

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) является доминирующей патологией в структуре неспецифических воспалительных заболеваний органов дыхания. Но вместе с этим, ХОЗЛ является достаточно частым спутником туберкулезного поражения легких, усугубляющего процесс, ускоряющего развитие легочной недостаточности, легочной гипертензии, хронического легочного сердца. Так, при очаговом туберкулезе легких бронхиальная обструкция встречается в 52,7%, инфильтративном – в 56,6%, фиброзно-кавернозном – в 76,9%, диссеминированном – в 88,2% случаев. В свою же очередь ХОЗЛ предшествует туберкулезу легких в 21% случаев [8]. Хроническое обструктивное заболевание легких, наряду со снижением ЖЕЛ достаточно часто, по собственным наблюдениям, выявляется у больных с ожирением, которое в свою очередь представляет собой частую хроническую патологию в популяции. При этом, могут быть явные клинические проявления болезни, а также субклинические, верифицируемые спирографически. По видимому, избыточный вес, а тем более, ожирение, являются независимыми факторами риска ХОЗЛ. Уменьшение экскурсии диафрагмы закономерно влечет за собой уменьшение подвижности бронхов малого калибра (с просветом 2-3 мм), в базальных отделах легких, с застоем бронхоальвеолярного секрета, его инфицированием и последующими аутоиммунными реакциями.

Существующие несколько десятилетий тому назад представления о хроническом бронхообструктивном заболевании легких, как о локальном явлении, в настоящее время радикально пересмотрены. Системные иммунные и гемостазиологические изменения указывают на дисфункцию Т-клеточного звена иммунитета, повышение активности провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-6, функциональной активности нейтрофилов, повышение уровней острофазовых белков – С-реактивного протеина, фибриногена, снижение уровней антитромбина-III, активаторной активности кровяного плазминогена [2,9]. Очевидно, что на завершающих стадиях болезни речь идет о системной гипоксемии, синдроме системного воспалительного ответа, но и в начале процесса, ХОЗЛ представляет собой своего рода «эпицентр», воспалительного состояния, от которого волны воспалительных реакций расходятся системно, инициируя и потенцируя патологические состояния вне органов дыхания, таких как ишемическая болезнь сердца (в том числе с одномоментными обострениями ХОЗЛ и ИБС), пульмогенная артериальная гипертензия, хронический гастрит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, остеопороз, дисбактериозы, вторичный эритроцитоз и анемию, дисфункцию скелетных мышц [2,3,8]. Однако вопросы ранней диагностики и соответственно адекватного лечения ХОЗЛ, попрежнему, к сожалению, представляют собой насущную проблему. Так, ХОЗЛ предшествует 3-15-летний субклинический период заболевания, в котором пациенты как правило находятся вне поля зрения пульмологов [8,10,12]. Основным же, очевидно, критерием диагностики ХОЗЛ является снижение ОФВ1 от 80% и ниже и ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, тогда как субклинический период болезни оказывается за рамками данного диагностического критерия, кроме того, не достаточное внимание уделяется изменениям МОС 25-75%. Кроме того, современное понятие хронического бронхообструктивного синдрома предусматривает изменения ОФВ1 < 80% и ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, регистрируемых как минимум три раза в течение одного года, независимо от проводимой терапии [6]. Но, хронический бронхообструктивный синдром находится вне рамок диагноза ХОЗЛ. В 2005 году была предложена нулевая степень тяжести ХОЗЛ, для которой характерно лишь сочетание кашля с выделением мокроты и отсутствием спирометрических изменений [11], но к сожалению эта инициатива не получила должного отклика, что оказало тормозящее влияние на совершенствование методов диагностики начальных проявлений заболевания.

Кроме этого, ведущий клинический симптом ХОЗЛ, хронический кашель лишь только в недавнее время (2006 г.) получил свое определение, как кашель длительностью более 8 недель [4], в связи с чем значительное количество пациентов с симптомом «хронический кашель» не получили и не получают должной оценки, которая по мнению авторов [4] рекомендаций по ведению взрослых больных с кашлем, требует выполнения, по меньшей мере, комплекса диагностических мероприятий – рентгенографии органов грудной клетки или компьютерной томографии органов грудной клетки высокого разрешения, фибробронхоскопии, спирографии и анализа мокроты, направленных на поиск причин, объясняющих хронический кашель. Данный объем исследований позволяет в том числе выявить минимальные воспалительные изменения со стороны слизистой оболочки бронхов и констатировать факт если не ХОЗЛ, то хронического необструктивного бронхита. Диагноз «Хронический необструктивный бронхит» длительное время использовался достаточно широко, но в тоже время он логически рассматривался как предшествующее со-

стояние хроническому обструктивному бронхиту. По-видимому и в настоящее время не следует забывать о старой практике, а продолжать широко использовать диагноз хронического необструктивного бронхита (заболевания легких), в тех случаях, когда нет веских симптомов в пользу ХОЗЛ, но и соответственно не оставлять пациента без адекватной терапии обострений необструктивного бронхита, который под действием респираторной вирусной инфекции, β -адреноблокаторов, как правило, рано или поздно реализуется в клинически манифестное ХОЗЛ.

Диагностика же ХОЗЛ на поздних стадиях III-IV, не представляет сколь нибудь значимых проблем. Для данных стадий характерно: длительный, многолетний кашель, хроническая бронхообструкция, паренхиматозные изменения – центроацинарная эмфизема, буллезная эмфизема, диффузный пневмосклероз, легочная гипертензия, хроническое легочное сердце. Принципиальное место в современных воззрениях на патогенез эмфиземы легких занимают данные о том, что эмфизема есть форма медленно прогрессирующей деструкции паренхимы легкого, в основе которой лежат иммунопатологические реакции (в 66% случаев больных эмфиземой легких, непосредственно в паренхиме легкого выявлена лимфоидная инфильтрация) [1]. Несомненно, что существующие подходы к лечению ХОЗЛ на III-IV стадиях с постоянным приемом серетиды или симбикорта, спиривы или беродуала-Н, оказывают позитивное влияние, но проблема заключается как раз в том, что в большей части больные ХОЗЛ были выявлены в II-IV стадиях и им была назначено базисное лечение после многолетних или десятилетних предшествующих, не диагностированных стадий болезни, а следовательно больные не получали профилактическое лечение, – пульмопротекцию, направленную на тор-

можение развития поздних стадий болезни, т.е. ремоделирование бронхов и деструкцию паренхимы легкого – эмфизему.

Вопрос же лечения обострений хронического необструктивного бронхита, ХОЗЛ I стадии, согласно приказа №82 от 06.03.2008 г [5], предусматривает проведение базисной терапии бронхолитиками β_2 -агонистами короткого действия, холинолитиками короткого действия, муколитиками/мукоурегуляторами; по показаниям – антибактериальный препарат.

Принципиальный вопрос. Как долго применять ингаляционную терапию? Как правило, для консолидации ремиссии, развития стойкой ремиссии требуется 2-3 месяца ингаляционного применения холинолитика β_2 -агониста (беродуала-Н). Кроме того, как свидетельствует практический опыт достаточно хорошо себя зарекомендовали ингаляционные глюкокортикостероиды на фоне применения бронхолитиков. Рекомендуются дозы незначительные. Так для бекламетазона – по 100 мкг х 1-2 раза в день; длительность приема до 2-3-х недель, с одновременным или последующим приемом фенспирида по 80 мг 2 раза в день 2-3 месяца.

Таким образом, в настоящее время на- сущно необходимо диагностировать ХОЗЛ при I стадии, и по видимому отнестись спирографически выявленную бронхообструкцию минимального уровня к первой стадии ХОЗЛ, что позволит в условиях лечения замедлить прогрессию заболевания.

Некоторое время тому назад, в терапевтическую практику имплементировали диагноз «хронического заболевания почек» (органические или функциональные изменения, наблюдаемые от 3-х месяцев и больше), что радикальным образом изменило тактику лечения болезни почек, и наполнило термин «нефропротекция» конкретным содержанием. Этот позитив-

ный пример не должен не остаться без внимания. В связи с чем предлагается как хроническое обструктивное заболевание легких, так и хронически необструктивный бронхит считать таковыми начиная от 3-х месяцев болезни, что позволит своевременно начинать мероприятие – пульмопротекцию, в первую очередь препаратом тиотропия бромидом.

Литература

1. Аверьянов А.В., Самсонова М.В., Черняева А.А., Чучалин А.Г. Аспекты патогенеза эмфиземы легких у больных ХОБЛ // Пульмонология. – 2008, №3. С. 48-53.
2. Килесса В.В. Хронический бронхит и ишемическая болезнь сердца: новые патогенетические точки соприкосновения // Медицина сегодня и завтра. – 2002. - №2. С.33-36.
3. Кубышкин В.Ф., Солдатченко С.С., Кораленко Е.С. Сердечно-сосудистые заболевания и синдромы при легочной патологии – К., «Здоров'я», – 1995, 220 с.
4. Морис А.Х., Мак-Гарви Л., Паворд П. Рекомендации по ведению взрослых больных с кашлем // Пульмонология. – 2007. - №2. – С.10-39.
5. Приказ №82 «О внедрении корреktированных стандартов качества обследования и лечения больных с пульмонологической патологией. Симферополь, 06.03.08. МЗ АР Крым.
6. Шмелев Е.П. Бронхообструктивный синдром – универсальное патологическое состояние в пульмонологии // Медицина неотложных состояний. 2006; №5(6). С. 11-13.
7. Шмелев Е.П. Различия в диагностике и лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Consilium Medicum 2002; 4(9): 492-396.
8. Шмелев Е.П. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания // Пульмонология. – 2007. - №2. – С.5-9.
9. Agustí A.G.N., Noguera A., Sanleđa J. et al Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir.J. 2003; 21:347-360.
10. Buist S., Mapp C.E. European respiratory monograph 25: Respiratory diseases in women. Eur. Respir.Soc.J. 2003; 8:104.
11. Global initiative for chronic obstructive ta Lung Disease (COLD). Global strategy for the diagnosis management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: Updated 2005 (Based on an April 1998 NHLBI (WHO Workshop).
12. Storer D.E. Women, smoking and lung cancer. // Chest. – 1998; 113;1-2.

Деякі аспекти діагностики і лікування хронічного обструктивного захворювання легень на початкових проявах його розвитку

B.V. Кілесса

В роботі розглянуті проблемні аспекти діагностики і лікування хронічного обструктивного захворювання легень на початкових проявах його розвитку. Пропонується розглядати необструктивний хронічний бронхіт і хронічне захворювання легень починаючи від 3-х місяців захворювання. На початкових етапах розвитку хвороби доцільне комплексне інгаляційне лікування у тому числі з включенням топічного глюкокортикостероїду в період загострення захворювань, що є заходами в рамках пульмопротекції.

Ключові слова: хронічні обструктивне захворювання легень, пульмопротекція.

Some aspects of diagnosis and treatment of chronic obstructive lung disease in the early manifestations of its development

V.V. Kilessa

In the article considered the problem of diagnosis and treatment of chronically obstructive lung diseases in the early manifestations of its development. A deal not obstructive chronic bronchitis and chronic lung disease from 3 months of illness. At the primary stages of the disease be integrated inhalation therapy including the inclusion of topical corticosteroids in the period exacerbation of diseases that are the outputs of the pulmoprotection.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, pulmoprotection.