Новые решения в ингаляционной терапии обструктивных заболеваний легких*

С.Н. Авдеев

Напомним, что в первой части статьи речь шла о замене пропеллента в дозированных аэрозольных ингаляторах (ДАИ) с фреонов (хлорфторуглеродов – ХФУ) на гидрофторалканы (ГФА) и особенностях технологии Модулит, на основе которой созданы ДАИ беклометазона дипропионата (БДП) – Кленил и Кленил с Джет-системой, формотерола (Атимос) и комбинированный препарат БДП/формотерол (Фостер; в РФ находится в процессе регистрации).

Исследования формотерола Модулит (Атимос)

Терапевтическая эквивалентность препаратов формотерола в виде ДАИ Модулит (Атимос) и в виде дозированных порошковых ингаляторов (ДПИ) была оценена у взрослых больных бронхиальной астмой (БА) в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях (табл. 3) [36–39].

На протяжении 12 нед у 448 больных среднетяжелой/тяжелой БА сравнивали Атимос и формотерол ДПИ в дозах 24 мкг/сут [36]. Показатели ОФВ₁, ПСВ, а также частота побочных эффектов были сравнимы между двумя группами больных (см. табл. 3).

В других исследованиях (см. табл. 3) сравнивалась эффективность однократных доз препаратов (исследования “доза–ответ”). При оценке изменений ОФВ₁ в ответ на использование Атимоса и формотерола ДПИ в равных дозах (24 мкг) не было выявлено различий между препаратами (рис. 4) [37]. Для изучения бронхотективных свойств различных препаратов формотерола (Атимос, формотерол ДПИ и формотерол ХФУ) после ингаляции формотерола проводился провокационный тест с метахолином [38]. Сравнимые препараты не отличались между собой по провокационной дозе метахолина, необходимой для снижения ОФВ₁ на 20%, что свидетельствовало об их идентичной бронхотективной активности.

Bousquet et al. пришли к заключению, что бронхорасширяющее действие Атимоса проявляется быстрее, чем у формотерола ДПИ (медиана времени до начала эффекта 5 и 7,5 мин соответственно) [39]. Кроме того, длительность бронхорасширяющего эффекта также была большей у Ати-

моса: прирост ОФВ₁ >12% (и >200 мл) сохранялся дольше 720 мин у 51% больных после ингаляции Атимоса и у 33% – после ингаляции формотерола ДПИ.

Еще в одном исследовании изучали эффективность и безопасность Атимоса и формотерола ДПИ в тех дозовых режимах, которые обычно используют при тяжелых приступах БА – 12–96 мкг в течение 90 мин [40]. Оба препарата хорошо переносились больными и приводили к значимому приросту ОФВ₁ и ПСВ.

Таким образом, все проведенные исследования показали, что препараты формотерола в виде ДАИ Модулит и в виде ДПИ сравнимы по своей эффективности и безопасности у больных БА.

Di Marco et al. показана эффективность формотерола Модулит (Атимоса) и у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [41]. Препарат применяли у 19 больных ХОБЛ (средний ОФВ₁ 34% от должного). Атимос приводил к значительному улучшению показателей ОФВ₁, форсированной жизненной емкости легких и емкости вдоха, причем по влиянию на данные параметры у больных ХОБЛ формотерол Модулит практически не отличался от тиотропия.

Исследования комбинированного препарата БДП/формотерол Модулит

Эффективность нового комбинированного препарата БДП/формотерол Модулит была изучена в 4 рандомизированных контролируемых исследованиях у больных среднетяжелой и тяжелой БА [42–45]. В этих исследованиях про-

Рис. 4. Динамика ОФВ₁ у больных тяжелой БА после однократной ингаляции формотерола с помощью ДАИ ГФА Модулит (Атимос) или ДПИ (по Bousquet et al., 2005).

Сергей Николаевич Авдеев – докт. мед. наук, зам. директора НИИ пульмонологии Росздрава.

* Окончание. Начало см. в № 2, 2007 г.

Таблица 3. Данные клинических исследований, сравнивавших терапевтическую эффективность формотерола Модулит, формотерола ДПИ и формотерола ХФУ

Исследование	Дизайн исследования*	Пациенты	Схема терапии	Первичные конечные точки	Различие (95% ДИ**) между формотеролом Модулит и препаратами сравнения по первичным точкам
Dusser et al., 2005	12-недельное в параллельных группах	448 больных средне-тяжелой–тяжелой БА	Формотерол Модулит 12 мкг 2 раза в сутки Формотерол ДПИ 12 мкг 2 раза в сутки	Утренняя ПСВ#	-0,88 л/мин
Bousquet et al., 2005	Перекрестное плацебоконтролируемое с однократной дозой	49 больных средне-тяжелой–тяжелой БА	Формотерол Модулит 12 мкг Формотерол ДПИ 12 мкг Плацебо	12-часовой средний ОФВ ₁ ##	-29,4 мл (-72,7–13,9)
Houghton et al., 2004	Перекрестное плацебоконтролируемое с однократной дозой	39 больных легкой–среднетяжелой БА	Формотерол Модулит 12 мкг Формотерол ДПИ 12 мкг Формотерол ХФУ 12 мкг Плацебо	Ig ПД ₂₀ ###	По сравнению с ДПИ: -0,28 (-0,84–0,29); по сравнению с ХФУ: -0,28 (-0,84–0,28)
Bousquet et al., 2005	Перекрестное плацебоконтролируемое с однократной дозой	51 больной средне-тяжелой/тяжелой БА	Формотерол Модулит 12 мкг Формотерол Модулит 24 мкг Формотерол ДПИ 24 мкг Плацебо	12-часовой средний ОФВ ₁	Формотерол Модулит 24 мкг по сравнению с ДПИ: -15 мл (-60–30)

* Все исследования были двойными слепыми рандомизированными.

** Доверительный интервал.

Пиковая скорость выдоха.

Объем форсированного выдоха за 1-ю секунду.

Провокационная доза метахолина, необходимая для снижения ОФВ₁ на 20%.

водилось сравнение БДП/формотерола Модулит в дозе 100/6 или 200/12 мкг 2 раза в сутки с монотерапией БДП (ДАИ ХФУ) и/или с комбинациями: БДП ХФУ + формотерол ДПИ, флутиказон/сальметерол ХФУ, будесонид/формотерол ДПИ. Исследования длились 12–24 нед, включали двухнедельный вводный период, а в качестве первичной конечной точки была выбрана утренняя ПСВ в течение последних 14 дней исследования.

БДП/формотерол Модулит оказался более эффективным препаратом, чем БДП ХФУ, по влиянию на функциональные показатели, хотя суточные дозы БДП в группе комбинированной терапии были в 2,5 раза меньше [42, 43]. Число обострений было также достоверно меньше у больных БА, принимавших БДП/формотерол Модулит, по сравнению с терапией БДП ХФУ (82 и 111 случаев) [42] или с сочетанием БДП ХФУ и формотерола ДПИ в отдельных ингаляторах (6 и 12%) [43]. В работах, сравнивавших БДП/формотерол Модулит с другими фиксированными комбинациями (флутиказон/сальметерол и будесонид/формотерол), не было выявлено различий между препаратами по влиянию на функциональные и клинические показатели, частоте обострений и нежелательных реакций [44, 45].

Интересно отметить, что БДП/формотерол Модулит и будесонид/формотерол приводили к приблизительно одинаковым изменениям функциональных показателей у больных БА, но при этом номинальная доза БДП была в 2 раза меньше, чем будесонида [45]. Это обусловлено тем, что БДП/формотерол Модулит образует мелкодисперсный аэрозоль: срединный массовый аэродинамический диаметр частиц БДП и формотерола равен 1,4 и 1,5 мкм [46, 47].

Заключение

Ингаляционная технология Модулит имеет следующие преимущества:

- высокая воспроизводимость дозы препарата;
- меньшая скорость высвобождения препарата;
- более продолжительное время жизни аэрозоля;
- улучшенная координация больного с ингалятором;
- уменьшение отложения препарата в ротоглотке;
- повышение легочной депозиции препарата;
- стабильность препарата при хранении;
- доказанная клиническая эффективность препаратов БДП, формотерола и БДП/формотерола, созданных на основе технологии Модулит.

Список литературы

1. Tashkin D.P. // Respir. Care. 1991. V. 36. P. 977.
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2006 // www.goldcopd.com
3. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2006 // www.ginasthma.com
4. Cochrane M.G. et al. // Chest. 2000. V. 117. P. 542.
5. Авдеев С.Н. // Рус. мед. журн. 2002. V. 10. № 5. P. 255.
6. Bousquet J. // Respir. Med. 2002. V. 96. Suppl. D. P. 1.
7. Woodcock A et al. // Respir. Med. 2002. V. 96. Suppl. D. P. 9.
8. Tansey T. // Br. J. Clin. Pract. Suppl. 1997. V. 89. P. 22.
9. Tashkin D.P. // J. Allergy Clin. Immunol. 1998. V. 101. P. 409.
10. Matthys H. // Eur. Respir. Rev. 1997. V. 7. P. 29.
11. Montreal protocol on substances that deplete ozone layer // www.unep.org/ozone/Montreal-Protocol/Montreal-Protocol2000.shtml
12. Hendeles L. et al. // N. Engl. J. Med. 2007. V. 356. P. 1344.

АТИМОС

формотерол 12 мкг/доза; 100 доз
β₂-агонист длительного действия

13. June D. // Eur. Respir. Rev. 1997. V. 7. P. 32.
14. Hayman G. // Br. J. Clin. Pract. Suppl. 1995. V. 49. P. 2.
15. Leach C.L. // Eur. Respir. Rev. 1997. V. 7. P. 35.
16. Harrison L.I. et al. // J. Pharm. Pharmacol. 1996. V. 48. P. 596.
17. Donnell D. et al. // Eur. J. Clin. Pharmacol. 1995. V. 48. P. 473.
18. Acerbi D. et al. // Pulm. Pharmacol. Ther. 2007. V. 20. P. 290.
19. Lipworth B.J. // Respir. Med. 2000. V. 94. Suppl. D. P. 13.
20. Leach C.L. et al. // Eur. Respir. J. 1998. V. 12. P. 1346.
21. Ganderton D. // J. Aerosol Med. 1999. V. 12. Suppl. 1. P. 3.
22. Ganderton D. et al. // Respir. Med. 2002. V. 96. Suppl. D. P. 3.
23. Brambilla G. et al. // Int. J. Pharm. 1999. V. 186. P. 53.
24. Woodcock A. et al. // J. Aerosol Med. 2002. V. 15. P. 407.
25. Lewis D.A. et al. // Respiration. 2005. V. 72. Suppl. 1. P. 3.
26. Sommerer K. Airflow Resistance of Different Inhalation Devices and Visualization of the Aerosol Plume Emitted by Different Metered Dose Inhalers. Hamburg, 2005.
27. Acerbi D. et al. // European Respiratory Society Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17–21, 2005.
28. Meyer T. et al. // J. Aerosol Med. 2004. V. 17. P. 43.
29. Acerbi D. et al. // Resp. Drug Deliv. 2000. V. 2. P. 395.
30. Anderson P.B. et al. // J. Invest. Allergol. Clin. Immunol. 2002. V. 12. P. 107.
31. Woodcock A. et al. // J. Aerosol Med. 2002. V. 15. P. 407.
32. Rocca-Serra J.P. et al. // Clin. Drug Invest. 2002. V. 22. P. 653.
33. Lee T.L. et al. // Pediatr. Allergy Immunol. 2002. V. 15. P. 133.
34. Vondra V. et al. // Respir. Med. 2002. V. 96. P. 784.
35. Acerbi D. et al. // Pharmaceuticals Sciences Fair & Exhibition. Nice, France, 12–17 June, 2005.
36. Dusser D. et al. // Respiration. 2005. V. 72. Suppl. 1. P. 20.
37. Bousquet J. et al. // Respiration. 2005. V. 72. Suppl. 1. P. 13.
38. Houghton C.M. et al. // Br. J. Clin. Pharmacol. 2004. V. 58. P. 359.
39. Bousquet J. et al. // Respiration. 2005. V. 72. Suppl. 1. P. 6.
40. Molimard M. et al. // Respiration. 2005. V. 72. Suppl. 1. P. 28.
41. Di Marco F. et al. // Respir. Med. 2006. V. 100. P. 1925.
42. Bonnet-Gonod F. et al. // 16th Annual Congress of the European Respiratory Society. Munich, September 2–6, 2006. P. 1237.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХОБЛ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРМОТЕРОЛ
в виде дозированного
аэрозольного
ингалятора

Свобода дыхания!

- действует быстро и эффективно
- прост и удобен в использовании

ООО "КЪЕЗИ Фармасьютикалс"
101509, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, офис 701
Тел.: (495) 967 12 12, факс: (495) 967 12 11

43. Bonnet-Gonod F. et al. // 16th Annual Congress of the European Respiratory Society. Munich, September 2–6, 2006. P. 1230.
44. Paggiaro P. et al. // 16th Annual Congress of the European Respiratory Society. Munich, September 2–6, 2006. P. 1227.
45. Papi A. et al. // Eur. Respir. J. 2007. V. 29. P. 682.
46. Dhillon S., Keating G.M. // Drugs. 2006. V. 66. P. 1475.
47. Lewis D. et al. // Respir. Drug Deliv. 2006. V. 3. P. 939. ●