

**Tokareva N.G.***Mordovia Ogarev State University, Medical Faculty, Chair of Nervous Diseases and Psychiatry, Saransk.*

ON CONTEMPORARY STATE OF AGGRESSIVE FORMS OF BEHAVIOUR

In recent time the problem of aggressiveness acquires very acute medico-social direction and is one of the most actual problems. Intense and unstable social, economic, ecological situation shaped in our society at the present time, stipulates growth of different deviations in persons development and people's behavior.

Key words: problem of aggressiveness, alienation, increased anxiety, deviations in person's development.

Токарева Н.Г.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
Медицинский институт, кафедра нервных болезней и психиатрии, г. Саранск

О СОСТОЯНИИ АГРЕССИВНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ

В последнее время проблема агрессивности приобретает все более острую социальную направленность и является одной из наиболее актуальных. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост различных отклонений в личном развитии и поведении людей.

Ключевые слова: проблема агрессивности, отчужденность, повышенная тревожность, отклонения в личном развитии.

Необходимость определения реальных психологических причин агрессивности в поведении, раскрытия условий, средств ее предотвращения и коррекции обуславливает актуальность настоящей работы.

Цель данного исследования - изучить особенности проявления агрессивности у людей с психоневрологической патологией.

Для реализации поставленной цели на экспериментальном этапе исследования проведен психологический анализ агрессивных форм поведения и нарушений





эмоциональной сферы у лиц с психоневрологической патологией с помощью методики диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого).

Исследование проводилось на базе психоневрологического интерната. Было обследовано две группы пациентов: первая группа была представлена пациентами с олигофренией в степени дебильности (20 чел.); вторая группа (20 чел.) состояла из лиц, страдающих маниакально-депрессивным психозом. Возраст обследуемых составлял от 18 до 30 лет.

При изучении индекса агрессии по методике Басса-Дарки нами были получены следующие результаты: среднее значение индекса агрессии во второй исследуемой группе составило $25,56 \pm 0,70$ баллов, что на 27,9% ($p < 0,05$) выше чем у

пациентов, страдающих олигофренией ($19,98 \pm 0,85$); у 90% респондентов значение индекса агрессии находилось в пределах нормы (17-25 баллов) и у 10% было даже несколько ниже нормы (16,3 балла). У 50% обследуемых во 2 группе индекс агрессии превышал нормальные значения (17-25 баллов), а у оставшихся 50% его значение приближалось к верхней границе нормы, принимая значения от 22,1 баллов до 24,9 баллов. У больных 2 группы среднее значение индекса враждебности составило $11,52 \pm 0,49$ баллов, у больных 1 группы $7,26 \pm 0,76$ баллов.

Таким образом, результаты исследования могут быть учтены при проведении коррекционных и реабилитационных мероприятий у лиц с психоневрологической патологией.

