

ID: 2012-09-23-T-1644

Тезис

Кудяшева А.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю., Воробьев С.В., Лупанов И.А.

**Оптимизация нейропсихологической диагностики умеренных когнитивных нарушений
цереброваскулярной этиологии***ФГБОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург*

Цель: совершенствование ранней диагностики умеренных когнитивных нарушений у больных с цереброваскулярной патологией.

Материалы и методы. Обследованы 46 пациентов (33 мужчины и 13 женщин) с умеренными когнитивными расстройствами сосудистого генеза в возрасте от 52 до 87 лет (в среднем $67 \pm 2,1$ года). Все пациенты прошли нейропсихологическое тестирование с использованием комплекса валидизированных тестов, включавшего: модифицированный тест А.Р. Лурия (1969); модифицированный тест таблицы Шульте; тест рисования часов (Sunderland, 1983); батарею лобной дисфункции (Dubois B., 2000); краткое исследование психического статуса (Folstein M.F., 1975) и Монреальскую Шкалу оценки когнитивных функций – MoCA (Nasreddine Z.S., 2005). Результаты тестирования были сопоставлены с данными клинко-неврологического и нейровизуализационного обследования.

Результаты. Для больных с умеренными когнитивными расстройствами сосудистой этиологии были характерны разнообразные когнитивные нарушения, зависящие от локализации характерных патологических изменений. Наличие лейкоареоза, атрофии и лакунарных инсультов в корковом веществе характеризовалось нарушениями праксиса, гнозиса и речи, в то время как патология подкорковых структур сопровождалась нарушениями кратковременной памяти и памяти на недавние события.

Выводы. Использование данного комплекса нейропсихологических тестов эффективно при обследовании больных с цереброваскулярной патологией, так как позволяет оценить весь спектр высших корковых функций и, в особенности, нейродинамические нарушения, характерные для таких больных. Выборочное применение любой из известных нейропсихологических методик не гарантирует точной диагностики вследствие полиморфизма клинической картины. Полученные результаты могут быть применены при построении диагностического поиска, обеспечивающего эффективную раннюю верификацию изменений интеллектуально-мнестических функций.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, нейропсихологическая диагностика.