

ID: 2013-02-257-T-2370

Тезис

Марзиева Т.А.

Особенности системы гемостаза у больных с острыми воспалительными процессами гениталий

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС

Научный руководитель: д.м.н., доцент Рогожина И.Е.

Цель данной работы – изучение состояния системы гемостаза у 28 пациенток с острым сальпингоофоритом, находившихся на стационарном лечении в гинекологическом отделении Малгобекской центральной районной больницы (г. Малгобек). Группу сравнения составили 15 практически здоровых женщин.

Контрольную группу составили 40 женщин с физиологическим течением беременности.

Состояние коагуляционного гемостаза и фибринолиза было изучено по общепринятым показателям (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, содержание фибриногена, время фибринолиза).

Как показали результаты исследований, при остром сальпингоофорите отмечалось укорочение АЧТВ, что указывает на повышение активности плазменных факторов гемокоагуляции ($p<0,05$). Значительно повышенным у обследованных нами больных было содержание фибриногена в крови ($p<0,02$). Одновременно отмечалось увеличение времени фибринолиза ($p<0,05$), что указывает на снижение фибринолитической активности крови. Достоверных изменений величины протромбинового индекса у обследованных нами больных с острыми воспалительными процессами придатков матки выявлено не было.

Заключение: Выявленные нами тромбофилические нарушения при воспалительных процессах придатков матки могут вести к ухудшению реологических свойств крови и нарушению процессов регенерации тканей. В связи с этим одним из направлений терапии больных острым сальпингоофоритом должна быть ликвидация у них гиперкоагуляционных сдвигов.

Ключевые слова

гемостаз, гениталии, острое воспаление