ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ ЦИТОСТАТИКАМИ

Е.С. Королева¹, В.Е. Гольдберг², В.М. Алифирова¹, Е.И. Симолина²,
Н.О. Попова², Н.С. Новикова¹

*ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, г. Томск¹
ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, г. Томск²
634050, г. Томск, Московский тракт, 2, e-mail: kattorina@list.ru¹*

У пациентов, страдающих раком молочной железы, после проведенной химиотерапии цитостатиками наблюдается сенсорно-моторная форма полиневропатии смешанного генеза (паранеопластического и токсического). Моторный дефицит возникает за счет аутоиммунных механизмов ППНП, тогда как основной вклад в нарушение болевой и температурной чувствительности вносит токсическое действие цитостатиков.

Ключевые слова: паранеопластическая полиневропатия, аксонопатия, демиелинизация, онконевральные антигены, химиотерапия.

CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF PARANEOPLASTIC POLYNEUROPATHY IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY WITH CYTOSTATICS

E.S. Korolyeva¹, V.E. Goldberg², V.M. Alifirova¹, E.I. Simolina², N.O. Popova², N.S. Novikova¹
*Siberian State Medical University, Tomsk¹
Cancer Research Institute, SB RAMS, Tomsk²
2, Moskovskiy Tract, 634050-Tomsk, Russia, e-mail: kattorina@list.ru¹*

Sensorimotor polyneuropathy of a mixed genesis (paraneoplastic and toxic) is observed in breast cancer patients after cytostatic chemotherapy. Motor deficiency occurs at the expense of autoimmune mechanisms of PNP, whereas toxic effects of cytostatic drugs contribute to disturbance of pain and temperature sensitivity.

Key words: paraneoplastic polyneuropathy, axonopathy, demyelination, onconeural antigens, chemotherapy.

Злокачественные новообразования являются важной медико-социальной проблемой и весьма актуальны в патогенезе поражения периферических нервных волокон. Рак легкого занимает 1-е место по смертности среди мужчин как в России, так и в мире в целом. Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место в структуре онкологической заболеваемости женского населения в России. В 2008 г. в РФ зарегистрировано 52469 новых случаев РМЖ, при этом с 2003 г. прирост заболеваемости РМЖ составил 13,4 % [6].

Паранеопластическая полиневропатия (ППНП) составляет 1 % всех полиневропатий, возникает у 3–8 % больных, главным образом, страдающих раком легкого, молочной железы, яичников и желудка. Она является причиной стойкой нетрудоспособности, приводит к снижению качества жизни, глубокой инвалидизации и даже смерти [2]. Уста-

новлено, что поражение периферических нервов не связано со сдавлением опухолью, метастатической диссеминацией, побочными эффектами радио- и химиотерапии, а также метаболическими, сосудистыми, гормональными нарушениями или оппортунистическими инфекциями. В основе ППНП лежит аутоиммунный ответ, запускаемый паранеопластическими антигенами, которые синтезируются раковыми клетками, локализованными за пределами нервной системы [7]. Ответная продукция онконевральных аутоантител и Т-лимфоцитов, их взаимодействие с нормальными белками нервных волокон, идентичными паранеопластическим антигенам, влечет возникновение неврологического дефицита. Клиническая симптоматика сенсорно-моторной полиневропатии минимум за 6 мес предшествует обнаружению первичной опухоли почти у 50 % пациентов [8–10].

Говоря о поражении периферических нервов при злокачественных опухолях, не следует забывать о таком специфическом системном осложнении химиотерапии, как нейротоксичность. Большая группа современных высокоэффективных цитостатиков, используемая в лечении патогномичных для ППНП форм рака, индуцирует клинически значимые, дозолимитирующие проявления нейротоксичности, которые требуют модифицирования доз, отсрочки очередных циклов или прекращения лечения. Развивается периферическая токсическая полиневропатия, являющаяся чаще всего результатом нарушения микротубулярной архитектоники аксонов наряду с прямым повреждением их дистальных отделов и дорсальных ганглиев (аксонопатия). Значительно реже отмечаются диффузная или сегментарная демиелинизация нейронов (миелопатия) или дегенерация их тел (нейронопатия) [2, 5].

Материал и методы

За период с 01.01.11 по 30.11.11 обследовано 40 женщин с диагнозом «полиневропатия», установленным согласно принятым в 1999 г. критериям ВОЗ. Все больные были разделены на две группы. В I группу вошли 20 пациенток, находящихся на лечении в отделении химиотерапии ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, средний возраст которых составил $52,7 \pm 5,4$ года, длительность полиневропатии – $2,8 \pm 2,8$ года, а количество курсов химиотерапии – $13,6 \pm 4,6$. Критерием включения явились гистологически подтвержденный рак молочной железы IV стадии без метастатического поражения головного и спинного мозга, клинические признаки поражения периферических нервов без других неврологических заболеваний в анамнезе. Во II группу (сравнения) включены 20 пациенток отделения эндокринологии и диабетологии на базе клиник ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, средний возраст которых составил $61,8 \pm 9,5$ года, страдающие полиневропатией в течение $5 \pm 1,1$ года. Критерием включения были больные с сахарным диабетом (СД) 2-го типа в стадии компенсации, с симптоматикой периферической полиневропатии. Другие заболевания центральной и периферической нервной системы на момент обследования отсутствовали. Всем пациентам была проведена электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей на аппарате Нейрон-спектр

4ВП с помощью программы Нейро-МВП (фирма «Нейро-Софт»).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (p – достигнутый уровень значимости). Описание качественных данных проводилось путем построения таблиц сопряженности с указанием абсолютных и относительных (%) частот встречаемости признаков. Для определения достоверности различий качественных признаков использовали анализ таблиц сопряженности (критерий χ^2 Пирсона, а также двусторонний точный тест Фишера в случае, если ожидаемое значение хотя бы в одной ячейке таблицы сопряженности было меньше 5). Проверка на нормальность распределения количественных данных проводилась по критерию Шапиро-Вилка. Математическую обработку результатов исследования проводили с использованием описательных статистик: медиана (Me) и интерквартильный размах (в виде 25 и 75 процентов, $Q1 - Q3$) – для данных, не соответствующих нормальному закону распределения; среднее значение (M) и стандартное отклонение (σ) – для нормально распределенных данных. Для анализа количественных признаков при сравнении двух независимых выборок применяли критерий Манна – Уитни [1, 3, 4].

Результаты и обсуждение

В процессе исследования обнаружено, что половина женщин I группы предъявляли жалобы на онемение конечностей, боли ноющего характера и постоянную слабость в дистальных отделах ног, 6 (30 %) – отмечали онемение и слабость, 2 (10 %) – беспокоила только слабость, усиливающаяся при физической нагрузке, 2 (10 %) – страдали от эпизодов онемения кистей и стоп ($p < 0,05$). Двигательные жалобы, имеющие место у 12 (60 %) пациенток, являются характерными для ППНП, возникающей при РМЖ, в связи с преимущественным поражением моторных волокон анти-Ri нейрональными антителами. В данной группе больных полиневропатия имеет смешанный генез (паранеопластической и токсической) ввиду проведенной химиотерапии, поэтому жалобы на нарушение чувствительности, выясненные у 90 % больных, являются преимущественно манифеста-

цией нейросенсорных симптомов после лечения цитостатиками. Анализ неврологического статуса выявил снижение мышечной силы в руках у 14 (70 %) участники исследования ($p < 0,05$). При этом у 2 (10 %) из них она оценивалась на 4–5 баллов, у 12 (60 %) – на 3–4 балла ($p < 0,05$). Снижение силы мышц нижних конечностей наблюдалось у 16 (80 %) женщин, из которых 12 (60 %) имели силу 4–5 баллов, у 4 (20 %) больных она составила 3–4 балла ($p > 0,05$). Глубокие рефлексy с верхних конечностей оказались симметрично снижены у 8 (40 %) пациентов ($p < 0,05$). Рефлексy нижних конечностей были снижены симметрично у 100 % обследуемых I группы ($p < 0,05$). Среди них у 2 (10 %) больных отсутствовали коленные и ахилловы рефлексy с двух сторон, у 4 (20 %) – не вызывались только ахилловы рефлексy, а коленные оказались снижены, 14 (70 %) – имели снижение и коленных и ахилловых рефлексов ($p < 0,05$). Данная клиническая картина, по-видимому, связана с взаимодействием анти-Ri антител с белками нервных волокон, идентичными Ri антигенам, что приводит к сегментарной демиелинизации и даже валлеровской дегенерации. Нарушение поверхностной чувствительности по типу «перчаток» и «носок» имело место у всех женщин с онкологическим заболеванием после химиотерапии ($p > 0,05$). Установлено, что это, главным образом, связано с тем, что периферические аксоны не имеют гематоэнцефалического барьера, поэтому метаболиты цитостатиков путем прямой диффузии проникают в нервные волокна из окружающей интерстициальной жидкости и аккумулируются в них, вызывая повреждение внутриклеточного белка

Рис. 1. Распределение клинических симптомов полиневропатии в сравниваемых группах

тубулина, а также кинезина и актина. В результате нарушаются структура и функция микротрубочек и развивается аксонопатия сенсорных волокон. В патогенезе ППНП также имеет место поражение чувствительных нервов конечностей, но ее вклад в клиническую картину в данном случае ничтожно мал. Глубокая чувствительность оставалась интактна у 100 % пациенток, $p < 0,05$ (рис. 1). По данным электронейромиографии выявили аксонопатию и демиелинизацию у 12 (60 %) больных и исключительно аксонопатию – у 8 (40 %) женщин ($p > 0,05$). У 18 (90 %) пациенток I группы наблюдалось поражение нервных волокон как верхних, так и нижних конечностей, у 2 (10 %) – в патологический процесс вовлекались только дистальные отделы ног ($p < 0,05$) (рис. 2). Этот факт можно объяснить с точки зрения присоединения к ранее существующей ППНП (возникшей до обнаружения опухоли) с характерным восходящим процессом ретроградной аксональной дегенерации, начинающимся с самых длинных аксонов, токсического поражения периферических нервов на фоне лечения цитостатиками. Для проявлений нейротоксичности химиотерапии свойственны сенсорные симптомы с симметричным дистальным вовлечением кистей и стоп.

В группе сравнения у 18 (90 %) пациенток с СД 2-го типа преобладали жалобы сенсорного характера (рис. 1) ($p < 0,05$). Это связано с тем, что при диабетической невропатии (ДН) аксоны сенсорных волокон поражаются в большей степени, чем двигательных. У всех женщин II группы верхние конечности в патологический процесс вовлечены

Рис. 2. Особенности поражения периферических нервов в группах пациентов с вторичной полиневропатией

не были (рис. 2), что соответствует типичному для вторичных полиневропатий восходящему распространению патологического процесса. Мышечная сила в ногах оказалась снижена до 4–5 баллов у 12 (60 %) пациенток ($p>0,05$). Симметричное снижение сухожильных рефлексов нижних конечностей отмечено у 14 (70 %) больных ($p>0,05$). Среди них у 6 (30 %) отсутствовали только ахилловы рефлексы, у 6 (30 %) наряду с ахилловыми не вызывались коленные рефлексы с двух сторон ($p>0,05$). Данная картина является следствием гликирования миелина, когда развивается демиелинизация и нарушение проводимости нервных волокон. Снижение болевой и температурной чувствительности в дистальных отделах ног отмечалось у 18 (90 %) больных ($p>0,05$). Глубокая чувствительность страдала у 14 (70 %) женщин ($p<0,05$). Поражение сенсорной сферы принято связывать с раздражением или повреждением тонких немиелинизированных

C-волокон, проводящих болевую, температурную чувствительность и наиболее восприимчивых к изменениям активности метаболических процессов. Анализ данных электронейромиографии показал наличие аксонопатии наряду с демиелинизирующим процессом у 12 (60 %) пациенток и только аксонопатию – у 8 (40 %) ($p>0,05$). У всех больных с ДН страдают исключительно периферические нервы нижних конечностей, как двигательные, так и чувствительные. При анализе данных электронейромиографии в сравниваемых группах выявлен ряд особенностей, которые представлены в таблице.

Заключение

Проведенное исследование показало, что у пациенток, страдающих раком молочной железы, после цитостатической терапии наблюдается сенсорно-моторная форма полиневропатии смешанного генеза (паранеопластического и токсического). У подавляющего большинства больных

Таблица

Показатели моторного ответа у больных в сравниваемых группах

Признак	I группа Me (Q1-Q3)	II группа Me (Q1-Q3)	P
Амплитуда n. Suralis справа	16,6 (11,0–26,2)	82,1 (25,8–166,6)	0,013*
Амплитуда n. Suralis слева	23,4 (7,6–38,30)	47,6 (19,1–107,4)	0,045*
Скорость проведения по n. Suralis справа	57,4 (42,1–80)	26,3 (21,9–61,0)	0,045*
Скорость проведения по n. Suralis слева	71,4 (40,0–75,8)	51,5 (21,6–69,6)	0,226
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа predplusna	1,4 (0,6–3,6)	1,3 (0,8–2,5)	0,940
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа fibularis	1,2 (0,3–3,1)	0,8 (0,4–1,5)	0,496
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа poples	2,2 (1,1–4,9)	0,9 (0,6–1,8)	0,151
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева predplusna	1,6 (1,3–2,0)	2,2 (1,4–2,5)	0,326
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева fibularis	1,4 (1,0–2,1)	1,5 (0,8–2,4)	0,910
Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева poples	1,8 (1,7–3,3)	1,8 (1,0–2,6)	0,364
Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа fibularis	49,3 (46,0–55,2)	50,5 (48,3–51,9)	1,000
Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа poples	55,5 (47,1–72,0)	53,0 (46,7–55,8)	0,345
Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева fibularis	47,8 (44,1–52,0)	51,4(46,9–55,5)	0,241
Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева poples	55,1 (53,3–64,5)	56,3 (53,3–58,3)	0,791

Примечание: * – различия между сравниваемыми группами статистически значимы ($p<0,05$).

в патологический процесс одновременно вовлекаются нервные волокна как нижних, так и верхних конечностей. Изолированного поражения периферических нервов рук в исследуемой выборке не наблюдалось. Результаты проведенной ЭНМГ свидетельствуют об одновременном присутствии аксональной дегенерации и демиелинизации нервных структур у большинства женщин, а также об изолированной аксонопатии у меньшего количества обследованных. Полученные данные позволяют предположить, что моторный дефицит возникает у пациенток в исследуемой группе за счет аутоиммунных механизмов ППНП, тогда как основной вклад в нарушение болевой и температурной чувствительности вносит токсическое действие цитостатиков. Опираясь на детальное изучение показателей ЭНМГ, можно сделать вывод о превалировании аксонопатии над демиелинизирующим процессом и, следовательно, о первичном нарушении архитектоники нервного волокна и вторичном присоединении миелопатии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 459 с.
2. Левин О.С. Полинейропатии: Клиническое руководство. М.: Медицинское информационное агентство, 2005. 495 с.
3. Леонов В.П. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и рецензентов. М.: Практическая медицина, 2011. 488 с.
4. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. М.: Медиа Сфера, 2004. 352 с.
5. Семенова А.И. Кардио- и нейротоксичность противоопухолевых препаратов (патогенез, клиника, профилактика, лечение) // Практическая онкология. 2009. Т. 10, № 3. С. 168–176.
6. Чойзонов Е.Л., Писарева Л.Ф., Жуйкова Л.Д. Злокачественные новообразования в Томской области в 2004–2009 гг. Оценка качества диагностики // Сибирский онкологический журнал. 2011. № 3 (45). С. 29–34.
7. Шнайдер Н.А., Дыхно Ю.А., Ежикова В.В. Клиническая гетерогенность паранеопластического неврологического синдрома // Сибирский онкологический журнал. 2011. № 3 (45). С. 82–90.
8. Kempler P. Neuropathies. Pathomechanism, clinical presentation, diagnosis, therapy. Berlin: Springer, 2002. 208 p.
9. Molina-Garrido M.J., Guillen-Ponce C., Martinez S., Guirado-Risueño M. Diagnosis and current treatment of neurological paraneoplastic syndromes // Clin. Transl. Oncol. 2006. Vol. 8 (11). P. 796–801.
10. Musunuru K., Darnell R.B. Paraneoplastic neurologic disease. Antigens: RNA-Binding Proteins and Signaling Proteins in Neuronal Degeneration // Ann. Rev. Neurosci. 2001. Vol. 24. P. 239–262.

Поступила 28.03.12