

РЕКОМЕНДОВАНО ОБЩЕСТВОМ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЗ РФ

2010

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМАХ

Генетические факторы риска

Тромбофилические полиморфизмы	Баллы
Гетерозиготный полиморфизм I/D в гене <i>PLAT</i>	0
Гетерозиготный полиморфизм G/A 455 в гене фибриногена	
Гетерозиготные полиморфизмы в генах <i>GP IIIa</i> , <i>GP Ia</i> и <i>PAI-1</i>	1
Гомозиготный полиморфизм I/I в гене <i>PLAT</i>	
Гомозиготный полиморфизм A/A в гене фибриногена	
Гетерозиготный полиморфизм C677→T в гене <i>MTHFR</i>	2
Гомозиготные полиморфизмы в генах <i>GP IIIa</i> , <i>GP Ia</i> и <i>PAI-1</i>	
Гомозиготный полиморфизм C677→T в гене <i>MTHFR</i>	3
Гетерозиготная мутация фактора V Лейден	
Гетерозиготный полиморфизм G20210→A в гене протромбина	
Гомозиготная мутация фактора V Лейден	4
Гомозиготный полиморфизм G20210→A в гене протромбина	

Группы риска при наследственной тромбофилии

- Высокий риск ≥ 4 баллов.
- Умеренный риск 2–3 балла.
- Низкий риск 0–1 балл.

Специализированные центры по ведению беременных групп высокого риска по тромбоэмболическим осложнениям:

- Центр тромбофилии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН (тел.: 328-98-31; 328-98-49), Менделеевская линия, д. 3.
- Городской акушерский гематологический центр (женская консультация № 30; родильный дом № 6 им. проф. Снегирева В. Ф.; тел.: 273-69-04), ул. Маяковского, д. 5.