

ID: 2012-11-8-T-1766

Тезис

Богова В.С., Шелехова Т.В., Зайцева М.Р., Махонько М.Н., Шкробова Н.В.

Патология желудка и двенадцатиперстной кишки по результатам медицинских осмотров

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность проблемы. Своевременное выявление и профилактика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки позволяет сохранить здоровье и трудоспособность работающего населения.

Цели и задачи. Выявление патологии желудка и двенадцатиперстной кишки у работников МУПП «Саратовводоканал», разработка профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Проанализированы данные периодического и дополнительного медицинских осмотров работников МУПП «Саратовводоканал» за 2011-2012 годы. Количество осмотренных составило 714 человек. Оценена эндоскопическая и гистологическая картина слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлена инфицированность *Helicobacter pylori* (НР). По профессиям это были: водители (28%), машинисты (21%), слесари (12%), токари (8,3%), аппаратчики хлораторных установок (12%), бульдозеристы (8,2%), экскаваторщики (6,1%) и прочие (4,4%).

Полученные результаты. У работников перечисленных профессиональных групп типичная клиническая картина патологии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки имела место у 43,5% обследованных. У 51,4% обследованных наблюдалось атипичное и латентное течение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Отсутствие изменений слизистой оболочки желудка выявлено у 34 рабочих (4,8%), двенадцатиперстной кишки у 230 человек (32,2%). Среди всех изменений преобладал гастрит у 690 человек (96,6%). Преимущественной локализацией этих изменений являлся антральный отдел (226 человек – 32,7%). Пангастрит диагностирован у 149 человек – 21,6%, а атрофический гастрит у 153 – 22,2%. Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки обнаружена у 132 больных (18,5%). Дуоденит, сочетающийся с гастритом, во всех случаях выявлен у 203 обследованных (28,4±0,5%). Эрозии диагностированы у 180 человек (25,2%). Эрозивный гастродуоденит выявлен чаще у водителей (36,2%) и аппаратчиков (32,3%). Язвенный дефект обнаружен у 115 рабочих (16,1%). По профессиям – язва луковицы двенадцатиперстной кишки чаще всего обнаруживалась у водителей и аппаратчиков. Уровень инфицированности (НР) при язвенной болезни был значительно выше (95,4±2,3%), чем при гастродуодените (67,8±4,3%) ($p<0,05$).

Выводы. При проведении медицинских осмотров выявлены: повышенная частота встречаемости гастродуоденитов, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка у профессиональных групп водителей и аппаратчиков. Особенностью клинической картины язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у них является скудная симптоматика и высокая инфицированность НР.

Ключевые слова: медицинские осмотры, желудок, двенадцатиперстная кишка