


МАТЕРИАЛЫ

4-го Международного научного конгресса

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санкт-Петербург, 11-13 ноября 2009 года

- 
- РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
 - ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
 - СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
 - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ им. Д. О. ОТТА СЗО РАМН
 - РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДОСКОПИСТОВ
 - ОБЩЕСТВО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
 - РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА
 - «ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»
 - RUSSIAN SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS
 - SAINT-PETERSBURG'S AND NORTH-WEST REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS SOCIETY
 - NORTH-WEST DEPARTMENT OF THE RUSSIA ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES
 - D. O. OTT INSTITUTE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RUSSIAN ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES
 - RUSSIAN ASSOCIATION OF GYNECOLOGIC-ENDOSCOPISTS
 - SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE AND SURGERY
 - RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOMETRIOSIS
 - JOURNAL OF OBSTETRICS & FEMALE DISEASES

11–13 November 2009, Saint-Petersburg, Russia
4th International Scientific Congress
THE OPERATIVE GYNECOLOGY — NEW TECHNOLOGIES



ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ NOTES-ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

© С. Ф. Басос¹, С. Б. Шейко¹, И. В. Берлев², А. С. Басос², Т. В. Аброськина¹, А. И. Билык¹

¹ Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, Санкт-Петербург, Россия

² Кафедра акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского, Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы

Одним из приоритетных направлений в хирургии является минимизация операционной травмы. Критерию минимальной травматичности в полной мере соответствуют эндоскопические внутривидеохирургические вмешательства. Эволюция малоинвазивных технологий позволила объединить эти методы лечения в хирургические вмешательства через естественные отверстия организма, «транслуминальные» или «NOTES-операции» и, тем самым, создать перспективный метод минимальноинвазивной хирургии.

Потенциальные преимущества NOTES — это уменьшение операционной травмы и болевого синдрома, сокращение сроков нетрудоспособности, отсутствие риска развития осложнений, связанных с повреждением передней брюшной стенки, возможность выполнять «безрубцовые» операции на органах брюшной полости.

Первая NOTES-операция была выполнена в 2007 году. Мировой опыт на начало 2009 года составлял около четырехсот трансвагинальных NOTES-операций.

Материал и методы

19 мая 2009 года в Санкт-Петербургской клинической больнице выполнена первая в Санкт-Петербурге NOTES-операция: трансвагинальная

холецистэктомия. Мы располагаем опытом выполнения пяти трансвагинальных лапароскопически-ассистированных холецистэктомий пациенткам от 29 до 59 лет.

Все больные прооперированы по поводу хронического калькулезного холецистита. В одном случае была выполнена симультанная операция: NOTES-трансвагинальная холецистэктомия и резекция левой доли щитовидной железы у пациентки с узловым зобом. Трое больных ранее перенесли хирургические вмешательства: резекцию яичника, кесарево сечение, аппендэктомию.

Предоперационное обследование больных и подготовка к операции соответствовали таковым при лапароскопической холецистэктомии, также исследовалась микрофлора влагалища и, при необходимости, проводилась его санация.

Среднее время операции составило 84 минуты. Интра- и послеоперационных осложнений не было. Все пациентки отмечали незначительный болевой синдром в течение первых суток после операции, выписаны из стационара на 3-и сутки.

Заключение

Таким образом, наш первый опыт NOTES-холецистэктомии демонстрирует перспективность этого метода как следующего этапа развития минимальноинвазивной хирургии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

© В. Ф. Беженарь, Е. Н. Байлюк, А. А. Цыпурдеева

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы

За последнее десятилетие с появлением современных высокотехнологичных средств профилактики спаек (противоспаечных барьеров — ПБ) особый интерес вызывает эффективность их применения у гинекологических больных в качестве одного из путей профилактики и лечения трубно-перитонеального бесплодия.

Появляются сообщения об эффективности использования ПБ с целью снижения частоты и степени распространенности спаечной болезни (СБ) и тазовых болей (ТБ). Данные литературы демонстрируют незначительное снижение частоты и степени распространенности СБ, оцениваемой при повторной лапароскопии у женщин с генитальным эндометриозом, мио-