

ID: 2013-11-8-T-3106

Тезис

Хупсергенова М.С., Елисеева А.А., Блинова В.В.

Приверженность к лечению больных с перенесенным повторным инфарктом миокарда*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России*

Цель: оценить приверженность к лечению пациентов с перенесенным повторным инфарктом миокарда.

Материалы и методы. Методом добровольного анкетирования и анализа карт стационарного больного для выяснения приверженности к лечению были изучены данные клинического обследования 36 пациентов с перенесенным повторным инфарктом миокарда в анамнезе в возрасте от 46 до 87 лет, среди которых было 16 (44,4%) женщин и 20 (55,5%) мужчин.

Результаты. В ходе опроса было выявлено, что 4 (11,1%) больных с перенесенным повторным инфарктом миокарда считают свое заболевание крайне опасно для жизни, достаточно опасно для жизни – 28 (77,8%), вредит здоровью, но жить с ним не опасно – 4 (11,1%) больных. Если лечить заболевание, то 28 (77,8%) пациентов отвечали, что возможно существенное улучшение самочувствия и увеличение продолжительности жизни, 8 (22,2%) – может быть улучшение самочувствия, но не продолжительности жизни. Применяют лекарственные препараты постоянно все пациенты с перенесенным повторным инфарктом миокарда в анамнезе, однако не в полном рекомендованном объеме. При анализе приверженности больных к немедикаментозной терапии, в частности соблюдению гипохолестериновой диете, оказалось, что в семьях только 16 (44,4%) пациентов с перенесенным повторным инфарктом миокарда соблюдались данные рекомендации.

Выводы. Проведенное исследование продемонстрировало, что информированность о заболевании и его осложнениях среди больных с перенесенным повторным инфарктом миокарда остается недостаточной, в связи с чем многие пациенты недооценивают серьезность заболевания и соответственно не выполняют в полном объеме рекомендации врача.

Ключевые слова: инфаркт миокарда