

**РАК ТЕЛА МАТКИ В СТРУКТУРЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2000–2005 гг.)****И.В. Залуцкий, И.А. Косенко, Н.Н. Пищик***ГУ «Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск*

На основании анализа сведений Белорусского канцер-регистра за 2000–2005 гг. установлено, что лидирующее положение среди опухолей женской половой сферы занял рак тела матки, составляющий 7,6 %. Показатели заболеваемости раком этой локализации (World standard) в Беларуси в 2005 г. достигли 19,9 на 100 000 городского женского населения и 13,0 – сельского. Аналогичные показатели в 2000 г. составили 16,7 и 9,1 на 100 000 женщин. Как и прежде, жительницы городов болеют раком тела матки чаще, чем сел, что объясняется особенностями социального поведения и репродуктивной функции. Употребление большого количества жиров и углеводов, малое число родов, бесплодие, наряду с другими факторами, приводят к хронической гиперэстрогении, обуславливающей развитие гиперпластических процессов эндометрия и злокачественной трансформации последнего.

Рак шейки матки обнаруживает тенденцию к увеличению уровня заболеваемости и составляет 4,8 % от общей онкологической патологии у женщин. Традиционно сохраняется более высокое число заболевших среди жительниц села (14,2 против 11,9 на 100 000 женского населения в городах). Это обстоятельство связано с такими этиологическими факторами болезни, как большое число родов, аборт, травм и высокая вероятность инфицирования вирусом папилломы человека.

Злокачественные новообразования яичников составляют 4,4 % в структуре онкологической патологии женщин. Заболеваемость раком этой локализации в изучаемый период в целом по республике

значимо не изменилась и составила 11,2 на 100 000 женского населения в городах, 9,6 на 100 000 – в селах.

Изучение динамики по возрасту показателей заболеваемости выявило увеличение числа заболевших среди молодых женщин. В частности, «пик» заболеваемости раком тела матки сместился к 59–61 годам, раком шейки матки – к 55–64, раком яичников – к 50–55, а количество больных в возрасте старше 65 лет значительно уменьшилось.

Распределение вновь выявленных случаев злокачественных заболеваний женской половой сферы по стадиям показало, что за 5 лет количество случаев рака гениталий I–II стадий увеличилось на 9 %. Причем рак шейки матки I–II стадий в 2005 г. выявлен у 73,2 % заболевших, рак тела матки – у 80,9 %, рак яичников – у 35,9 %. Число вновь выявленных случаев рака с неустановленной стадией заболевания уменьшилось в 1,5 раза.

Анализ смертности от рака рассматриваемых локализаций выявил ее снижение на 3,2 на 100 000 женщин за указанные 5 лет. Самые высокие показатели смертности в 2005 г. зарегистрированы у больных раком яичников – 5,3 на 100 000 женского населения. Вторая по частоте летальности локализация – рак шейки матки (4,3), третья – рак тела матки (3,3).

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в Республике Беларусь наблюдается рост заболеваемости раком тела матки, имеет место его «омоложение» на фоне некоторого снижения числа больных с запущенными стадиями за счет увеличения выявляемости заболеваний в I–II стадиях, а также прослеживается тенденция к снижению летальности.