

Аграновский М.Л., Мирзаев К.М., Газиева З.А., Ахмедова А.А., Тошбаев К.Т.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

*Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,
кафедра детских инфекционных заболеваний,*

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Республика Узбекистан

За последние годы заболеваемость вирусными гепатитами во многих странах мира не только не снижается, а, наоборот, заметно растет. Чрезвычайно высокой остается заболеваемость вирусными гепатитами и в областях Ферганской долины, в том числе и в Андижанской области.

Целью настоящей работы является изучение клиники психических расстройств при вирусных гепатитах.

Для решения поставленных задач нами было проведено клинико-психопатологическое обследование 58 больных: мужчин - 31 (53,5%), женщин - 27 (46,5%), находившихся на лечении в Андижанской областной инфекционной больнице.

У 35 больных (60,3%) был диагностирован вирусный гепатит А. У 23 больных (39,7%) - вирусный гепатит В.

У всех наблюдавшихся нами больных в 100% случаях отмечались астенические состояния, которые можно разделить на две основные группы: астенические состояния и невротоподобные церебростенические состояния.

Астенические состояния характеризовались повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, с преобладанием слезливости, вялости, апатичности, недомогания отмечались у 8 больных (13,7%).

Более тяжелое астеническое состояние отмечалось у 30 больных (51,7%).

У 7 больных (12,0%) невротоподобное состояние наблюдалось в двух вариантах: 1) с преобладанием синдрома раздражительной слабости, для которого характерны аффективная лабильность; 2) с преобладанием пониженного настроения, слезливости, повышенной возбудимости и быстронаступающего бессилия. У 4 больных (6,8%) отмечались ипохондрические состояния, при которых внимание к своему здоровью стало новилом чрезмерно утрированным.

Еще у 4 больных (6,8%) отмечалось расстройство сна, проявлявшееся бессонницей, не глубоким сном с частыми пробуждениями, снижением активности, апатичностью.

У 3 больных (5,1%) отмечались депрессивные нарушения, в частности, астеническая депрессия, которая сопровождалась выраженными астеническими расстройствами в виде повышенной утомляемости, истощаемости, а также раздражительной слабости и снижения настроения.

У 2-х больных (3,4%) при тяжелой злокачественной форме вирусного гепатита В самыми ранними и постоянными признаками были такие психические нарушения, как резкое психомоторное возбуждение, двигательное беспокойство, часто повторяющаяся рвота, своеобразный запах изо рта.

Таким образом, у больных с вирусными гепатитами отмечались психические расстройства, среди которых наиболее часто встречающейся была астеническая симптоматика. Поэтому для более эффективного лечения этих больных наряду с комплексной специфической терапией, целесообразно применять транквилизаторы в средних терапевтических дозах.