

ID: 2013-03-231-T-2109

Тезис

Щенникова Т.И. Бирюкова Н.В.

**Распространенность рака молочной железы в Саратовской области***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией**Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г.*

Рак молочной железы (РМЖ) – третья по частоте встречаемости нозологическая форма среди злокачественных опухолей, в структуре онкологической заболеваемости женского населения РМЖ занимает первое место. В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости РМЖ, в том числе у женщин молодого возраста.

**Цель исследования:** анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости раком молочной железы в Саратовской области.

**Задачи исследования:** анализ региональных особенностей заболеваемости РМЖ по данным литературных источников; данных официальных источников.

**Материалы и методы:** медико-статистический анализ по данным официальной отчетности ГУЗ «Областной онкологический диспансер №1» за 2007-2011 годы.

За анализируемые 5 лет наблюдается неуклонная тенденция к росту заболеваемости РМЖ: если в 2007 году показатель заболеваемости составил 65,1 на 100 тысяч населения, то показатель 2011 года 79,4 (по РФ 75,1). Пик возрастной кривой заболеваемости приходится на группу 60-64 лет. РМЖ на I-II стадии выявлен у 77,4% пациенток (в 2010 г. – 79,3%, по РФ – 63,6%), III стадии – у 16,7% (в 2010 г. – 14,1%, по РФ – 25,8%), IV стадии – у 5,9% (в 2010 г. – 6,6%, по РФ – 10,0%). Благодаря хорошо организованной профилактической работе и внедрению маммографического скрининга доля новообразований молочной железы, выявленных при профилактических осмотрах, увеличилась на 6,6% и составила 44,5% (в 2010 г. – 37,9%, по РФ – 25,8%).

По показателю одногодичной летальности в динамике за 5 лет отмечается его снижение с 6,3 в 2007 году до 5,7 в 2011 году, это свидетельствует о снижении случаев РМЖ, выявляемых на поздних стадиях опухолевого процесса. Доля больных РМЖ, выявленных при профилактических осмотрах возросла на 6,6% (44,5% в 2011 году, 37,9% в 2010 году).

Показатель смертности при раке молочной железы в 2011 году составил 32,0, в 2010 году 29,5, в РФ в 2011 году – 30,35.

За последние 5 лет отмечается рост заболеваемости РМЖ, показатель 2011 года выше среднероссийского уровня. Отмечается высокая выявляемость РМЖ на ранних стадиях и при профилактических осмотрах. Показатель смертности превышает средний по РФ. Таким образом, изучение проблемы заболеваемости раком молочной железы является актуальным в целях улучшения эпидемиологической ситуации в Саратовской области.

**Ключевые слова**

распространенность, рак, молочная железа