РЕФЛЕКТОРНО– МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРОПРИОЦЕПЦИИ И ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

Буков Ю.А., Жмурова Т.А.

Таврический Национальный Университет им. В.И. Вернадского г. Симферополь

Аннотация. Показано, что глубокий рефлекторно-мышечный массаж оказывает корригирующее действие на состояние церебрального кровотока, активизируя венозный отток. Усиление проприоцептивной активности выступает в качестве регулятора нарушенной моторно-висцеральной интеграции. Развитие неврозоподобных состояний на резидуально-органической основе у детей сопровождается изменениями в мышечной системе. Это приводит к ослаблению регулирующей роли проприоцептивного механизма в обеспечении моторно-висцеральной интеграции.

Ключевые слова: дети, состояния, неврозоподобные, массаж, кровоток, интеграция, проприоцепция

Анотація. Буков Ю.О., Жмурова Т.А. **Рефлекторно-м'язовий масаж у функціональній інтеграції проприоцепції і церебрального кровообігу у дітей з неврозоподібними станами.** Показано, що глибокий рефлекторно-м'язовий масаж надає коригуючу дію на стан церебрального кровотоку, активізуючи венозний відтік. Посилення проприоцептивної активності виступає як регулятор порушеної моторно-вісцеральної інтеграції. Розвиток неврозоподібних станів на резидуально-органічній основі в дітей супроводжується змінами в м'язовій системі. Це приводить до ослаблення регулюючої ролі проприоцептивного механізму в забезпеченні моторно-вісцеральної інтеграції.

Ключові слова: діти, стани, неврозоподібні, масаж, кровотік, інтеграція, проприоцепція

Annotation. Bukov Y.A., Zhmurova T.A. **Reflex and muscular massage in functional integration of proprioception and cerebral blood circulation of children in neurosis-like state.** It is shown that deep reflex and muscular massage has correcting effect on cerebral blood flow activating venous return. Increase in proprioceptual activity is a regulator of defective (anadequate) motor-visceral integration. Development of neurosolike states on a residual - organic basis at children is accompanied by changes in muscular system. It results in weakening a regulating role of the proprioceptive mechanism in security of motor-visceral integration.

Key words: children, state, neurosis-like, massage, blood flow, integration, proprioception.

Введение.

Исследования адаптационных возможностей организма человека, находящегося в различных функциональных состояниях, является одной из важнейших проблем, стоящей перед современной медико-биологической наукой. Как известно, особая роль в формировании приспособительных механизмов отводится скелетным мышцам, так как проприоцепция является основным рефлекторным механизмом, обеспечивающим моторно-висцеральную интеграцию. Нарушение ведущей роли мышечной системы в регуляции вегетативных функций организма приводит к разбалансировке не только моторно-висцеральных взаимоотношений, но и к изменениям на уровне центральной нервной системы. Вместе с тем следует отметить, что при патологических изменениях в самой мышечной ткани, связанных с локальной ишемией, нарушениями кровоснабжения и застойными явлениями, контрактурами могут формироваться патологические изменения на спинально-сегментарном уровне, а через спинальные рефлексы вызывать негативные сдвиги в центральных механизмах регуляции вегетативных функций [4]. Одним из примеров нарушений межсистемной интеграции могут служить неврозоподобные состояния на резидуально-органической основе у детей. Формированию неврозоподобных состояний способствуют вегетативно-сосудистая лабильность, повышение сосудистой аллергической реактивности организма, недостаточное кровенаполнение церебральных сосудов, а также нарушения ликвородинамики, нередко в виде гипертензивного синдрома [3]. Для детей с неврозоподобными состояниями характерна также сниженная физическая работоспособность. Недостаточные энергетические возможности скелетных мышц могут отразиться на метаболических процессах, и являться причиной дистрофических изменений в клетках мышечной ткани [1]. Одним из методов, позволяющим нормализовать интеграционные моторно-висцеральные взаимоотношения, является глубокий рефлекторно-мышечный массаж [2]. Вместе с тем в литературе практически отсутствуют данные о корригирующих эффектах рефлекторно-мышечного массажа на состояние мозгового кровообращения у детей младшего школьного возраста с неврозоподобными состояниями, что и послужило основанием для проведения настоящих исследований.

Работа выполнена по плану НИР Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Формулирование целей работы

Организация и методы исследования.

В исследованиях принимали участие 16 мальчиков в возрасте 8-10 лет с неврозоподобными состояниями на резидуально-органической основе. Программа коррекции состояла из процедур глубокого рефлекторно-мышечного массажа, который проводился по методике Аксёновой А.М. (1997).

Исследования мозгового кровообращения осуществляли с помощью диагностического комплекса DX-NT в стандартном положении пациента с компьютерной обработкой регистрируемых показателей. Одновременно с полушарной РЭГ регистрировали электрокардиограмму во II стандартном отведении. При записи РЭГ использовали два отведения: фронтотомастоидальное (FM) и окципитомастоидальное (OM), что позволило исследовать кровенаполнение внутренних сонных артерий и вертебробазиллярного бассейна. При этом

1	РИ, услед	1,66±0,16	1,76±0,08	1,45±0,11	1,58±0,10	>0,05	>0,05
2	ДСИ, %	68,6±6,0	70,0±3,9	69,0±3,4	65,9±3,4	>0,05	>0,05
3	А ЧП, Гц	2,33±0,18	2,63±0,27	2,22±0,15	2,40±0,19	>0,05	>0,05
4	α, мсек	159,3±18,5	144,6±13,6	121,3±13,2	111,3±2,9	<0,05	<0,05
5	α1, мсек	68,6±1,12	77,33±1,18	64,67±1,63	76,67±1,87	<0,05	>0,05
6	α2, мсек	90,67±6,05	67,33±3,92	54,67±2,26	34,6±2,72	<0,05	<0,05
7	ВО, %	16,27±8,21	5,80±2,50	48,25±5,65	8,35±2,66	<0,05	<0,05
8	В/А, %	57,15±8,75	63,36±8,32	45,85±10,46	49,98±8,52	>0,05	>0,05

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж за счёт активизации импульсной активности соответствующих рефлексогенных зон оказывал стимулирующее влияние на центральные механизмы регуляции мозгового кровотока. Отмечено уменьшение времени максимальной амплитуды кровенаполнения внутренних сонных и позвоночных артерий, в первую очередь, за счет снижения фазы медленного наполнения. Увеличение доли венозной компоненты РЭГ свидетельствовало об изменении тонуса мелких мозговых сосудов. Значительно возрос венозный отток крови из мозга к сердцу. Таким образом, рефлекторно-мышечный массаж способствовал оптимизации состояния венозной церебральной системы и повышению её роли в механизмах авторегуляции распределения крови в зонах исследования.

Оценка адаптационной тренированности отдельных систем организма может быть проведена на основании данных корреляционного анализа. Известно, что при предъявлении организму функциональных требований структурные компоненты органов и систем распределяют нагрузку между собой таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень функционирования соответствующий конкретным требованиям. Мозаичность включения отдельных элементов системы может быть определена при помощи выявления количества корреляционных взаимосвязей между отдельными параметрами исследуемой системы [6]. В нашем случае в качестве фактора повышенной функциональной нагрузки для организма выступал рефлекторно-мышечный массаж. Усиление проприоцептивной активности являлось основным регулятором моторно-висцеральной интеграции, проявляющейся в форме перестройки регуляторных влияний на параметры сердечной деятельности и церебрального кровотока. Исследования (рис.1) свидетельствуют, что количество достоверных корреляционных связей между функциональными показателями кардиогемодинамики и мозгового кровотока по мере проведения коррекции изменялось.

Рис.1. Количество корреляционных связей между исследуемыми показателями.

Наибольшее их число было зарегистрировано при первичном обследовании. В этой связи, наиболее выраженные негативные явления наблюдались в левом полушарии со стороны вертебробазилярного бассейна, подтверждающие высокую степень межполушарной асимметрии. Корректирующие воздействия способствовали оптимизации соотношений структурных компонентов системы, что проявилось снижением числа корреляционных связей. Выраженность асимметрии уменьшилась.

Выводы

1. Развитие неврозоподобных состояний на резидуально-органической основе у детей сопровождается изменениями в мышечной системе, что приводит к ослаблению регулирующей роли проприоцептивного механизма в обеспечении моторно-висцеральной интеграции.
2. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж способствует оптимизации приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы. Корректирующий эффект связан с повышением сократительной способности миокарда на 19,0 %, ($p < 0,05$), снижением энергетических трат сердечной деятельности на 11,0 %, ($p < 0,05$), усилением венозного оттока из мозга к сердцу, уменьшением межполушарной асимметрии.

3. Усиление проприоцептивной активности являлось основным фактором моторно-висцеральной интеграции, проявляющейся в форме перестройки регуляторных влияний на параметры сердечной деятельности и церебрального кровотока

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем рефлекторно-мышечного массажа в функциональной интеграции проприоцепции и церебрального кровообращения у детей с неврозоподобными состояниями.

Литература

1. Аксёнова А.М. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж и растяжение скелетных мышц при заболеваниях внутренних органов. – Воронеж, 1996.
2. Аксёнова А.М. Новая методика глубокого рефлекторно-мышечного массажа. //Педиатрия. – 1997. - №4.- С.30-33.
3. Антропов Ю.Ф., Бельмер С.В. Клинико-патогенетические закономерности соматизации психических расстройств в детском возрасте.//Педиатрия. – 2004.-№5.- С. 56 – 61.
4. Берсенев В.А. Шейные спинномозговые узлы (структура патофизиология синдромология).- М., 1980.
5. Мильке У. К определению нормальных реоэнцефалографических параметров в детском возрасте.//Неврология и психиатрия.- 1981.- Т.131.- Вып.- 10.- С. 1479-1482.
6. Михайленко А.А., Федотова Т.В. Роль корреляционных взаимосвязей в оценке функциональных возможностей иммунной системы. //Иммунология- 2000.- №6.- С. 59-61.

Поступила в редакцию 28.01.2008г.