



РЕЦЕНЗИЯ


заведующего кафедры оториноларингологии
ГОУ ВПО «Уральская государственная
медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию», доктора
медицинских наук, профессора
Абдулкеримова Хийира Тагировича,
на монографию

**«Клинико-морфологическая оценка
эффективности тканево-коллаген-
хитозановой трансплантации
в реконструктивной отохирургии»,**
подготовленную авторами:

Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов,
И. Д. Дубинец

Предлагаемая монография посвящена актуальной теме – повышение эффективности лечения хронического среднего отита. В монографии отражены алгоритм клинико-морфологической оценки приживления неотимпанального аутоототрансплантата в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита и перспективы реабилитации указанной категории пациентов. В данном научном издании содержатся основные сведения о теоретическом обосновании и практическом применении биосинтетических резорбируемых материалов в отохирургии, а так же способы комплексной оценки приживления неотимпанального аутоототрансплантата в послеоперационном периоде у пациентов с хроническим средним отитом.

Информативность рецензируемой монографии для врачей-оториноларингологов не вызывает сомнения, так как знания практических врачей о данной проблеме недостаточны. На основании результатов собственного исследования, посвященного изучению частоты и причин возникновения реперфораций в раннем и отдаленном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита у взрослых, ведущим проявлением которых является нарушение регионарной микроциркуляции и трофики неотимпанального аутоототрансплантата, авторы выделяют факторы риска формирования рецидива перфорации неотимпанальной мембраны у данной категории пациентов. В соответствии с приведенными данными, авторами определены направления и перспективы реабилитации пациентов в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита. Важным является раздел, подчеркивающий необходимость применения резорбируемых биосинтетических материалов, как средств стимуляции репаративной регенерации, при реконструктивных операциях на среднем ухе, которые позволяют ускорить процессы приживления неотимпанального аутоототрансплантата. Разработан алгоритм клинико-морфологической оценки состояния приживления неотимпанальной мембраны с использованием современной аппаратуры, который позволяет прогнозировать результаты реконструктивной хирургии при хроническом среднем отите. При-





ведены оптимальные сроки и схемы практического реализации методики применения «Коллахит» у пациентов в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита, способствующие повышению эффективности реабилитации пациентов с нарушениями слуха, снижению риска развития отогенных внутричерепных осложнений и тугоухости, улучшению их социальной адаптации.

Материалы монографии могут быть использованы при подготовке врачей-оториноларингологов по специальности оториноларингология. Научный уровень и содержание монографии соответствуют современным требованиям качества учебной литературы.

РЕЦЕНЗИЯ

*профессора кафедры патологической анатомии
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
доктора медицинских наук, Самохина Павла Андреевича, на монографию
**«Клинико-морфологическая оценка эффективности тканево-коллаген-
хитозановой трансплантации в реконструктивной отохирургии»**,
подготовленную авторами: Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов, И. Д. Дубинец*

Предлагаемое монографическое издание посвящено весьма актуальной теме – повышение эффективности лечения хронического среднего отита. В монографии отражены алгоритм клинко-морфологической оценки приживления неотимпанального аутоототрансплантата в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита и перспективы реабилитации указанной категории пациентов. В данной монографии содержатся основные сведения о современных особенностях эпидемиологии хронического среднего отита, исторические аспекты формирования основных методик реконструктивной отохирургии, теоретическое обоснование и практическое применение биосинтетических резорбируемых материалов в отохирургии, а так же способы комплексной оценки приживления неотимпанального аутоототрансплантата в послеоперационном периоде у пациентов с хроническим средним отитом. Информативность рецензируемого монографического издания для оториноларингологов и патологоанатомов не вызывает сомнения.

Предлагаемые ординальные полуколичественные методы оценки морфологических проявлений хронического воспаления слизистой оболочки среднего уха при хроническом среднем отите позволяют унифицировать подходы к прогнозированию результатов оперативного вмешательства. В соответствии с приведенными данными, авторами определены направления и перспективы реабилитации пациентов в послеоперационном периоде реконструктивной хирургии хронического среднего отита. Важным является раздел, подчеркивающий необходимость применения резорбируемых биосинтетических материалов, как средств стимуляции репаративной регенерации, при реконструктивных операциях на среднем ухе, которые позволяют ускорить процессы приживления неотимпанального аутоототрансплантата. Приведены оптимальные реабилитационные мероприятия, в которых нуждаются пациенты, страдающие хронической патологией среднего уха. Подчеркивается необходимость комплексной оценки клинко-морфологического и функционального результата отохирургии у данной категории пациентов.

Материалы монографии могут быть использованы при подготовке врачей-оториноларингологов по специальности оториноларингология. Научный уровень и содержание монографии соответствуют современным требованиям качества учебной литературы.