

ID: 2013-11-5-T-3076

Тезис

Пичугина Е.Н.

Современные аспекты съемного протезирования при частом отсутствии зубов с использованием бюгельных протезов из T.S.M. ACETAL

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии

Частичное отсутствие зубов является одним из самых распространенных заболеваний. По данным ВОЗ, им страдают до 75% населения. Утрата зубов является серьезной медицинской и социальной проблемой. При потере зубов нарушается функция жевания, что приводит к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Не менее серьезными являются последствия частичного отсутствия зубов: нарушения артикуляции и дикции сказываются на коммуникативных способностях пациента, эти нарушения, одновременно с изменениями внешности вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии жевательных мышц, могут обусловить изменения психоэмоционального состояния.

В последние годы довольно большое распространение получили частичные съемные бюгельные протезы из ацетатной пластмассы. Такие протезы имеют ряд преимуществ: во-первых: бюгельные каркасы и кламмеры из T.S.M. ACETAL превосходят металлические по эстетике; во-вторых: они легче металлических; в-третьих: не повреждают эмаль опорных зубов, следовательно, не требуется покрывать зубы коронками, они проще в обработке и подгонке; менее трудоемки в работе, т. к. отсутствует этап отливки металла; а также не вызывают аллергических реакций; и пациенты к ним быстрее привыкают. Кроме того, такие протезы, как и бюгельные не закрывают неба, что является положительным фактором для пациентов. В нашу поликлинику обратилась пациентка М. 1959 года рождения с жалобами на отсутствие зубов; нарушение функции жевания, речеобразования и эстетический недостаток. После проведенного обследования ей был поставлен диагноз: дефект зубного ряда верхней челюсти I класс 2 подкласс по Кеннеди; дефект зубного ряда нижней челюсти I класс 1 подкласс по Кеннеди. Потеря жевательной эффективности по Агапову 88 %. Так как пациентке было важно не только восстановить функцию жевания, но эстетический недостаток, в связи с ее профессией, то ей были предложены бюгельные протезы из ацетатной пластмассы и следующий план лечения: восстановить зубной ряд на верхней челюсти путем изготовления частичного съемного бюгельного протеза с кламмерной фиксацией на зубы 1.6,1.3, 2.3,2.4; восстановить зубной ряд на нижней челюсти путем изготовления частичного съемного бюгельного протеза с кламмерной фиксацией на зубы 4.6,4.4 и 3.4; восстановить функцию жевания, речеобразования и эстетику. После проведенного лечения пациентка осталась довольна своим новым внешним видом; наступила быстрая адаптация к протезам.

Таким образом, бюгельные протезы из T.S.M. ACETAL более эстетичные и более удобные в использовании, чем обычные пластиночные протезы, кроме того, они ничем не уступают в функциональном отношении бюгельным протезам с металлическим каркасом, правильно спланированные и грамотно изготовленные будут долго служить, ничем не выдавая себя для окружающих людей.

Ключевые слова: съемный протез, бюгельный протез