Слайд 1

Современные методы диагностики легочной гипертензии

А.В. Волков

ГУ Институт ревматологии РАМН

Слайд 2

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – рефрактерное заболевание, характеризующееся прогрессирующим повышением давления в сосудах легких и увеличением легочного сосудистого сопротивления. Вне зависимости от причин, в основе лежит подверженность сосудистого русла легких вазоконстрикции и структурному ремоделированию, приводящему к перегрузке правого желудочка и развитию хронической сердечной недостаточности.

Дефиниция ЛАГ
(гемодинамика – катетеризация правых отделов сердца)
- Среднее давление в ЛА > 25 мм.Нг в покое > 30 мм.Нг при нагрузке
- Давление заклинивания в ЛА < 15 мм.Нг

Клинические «последствия»

- Гипертрофия правого желудочка
- Правожелудочковая ХСН
- Прогрессирующая одышка, ограничение физической активности, смерть

Выживаемость при некоторых вариантах ЛГ и других заболеваниях

Заболевание	Выживаемость, лет
Рвм легких	0.5
ИЛАГ IV фк	1.0
Колорагильный рак	1.0
ЛАГ ССД	1.5
Неоп	2.5
ИЛАГ II фк	3.0
ИЛАГ I фк	5.0

Слайд 3

Эндотелиальная дисфункция, являющаяся пусковым нарушением при ЛАГ, приводит к преобладанию синтеза вазоконстрикторов (таких как эндотелин) над вазодилататорами (простациклин). Ремоделирование сосудов легких при легочной артериальной гипертензии включает в себя вазоспазм, подавление апоптоза и повышенную пролиферацию всех слоев сосудистой стенки.

Коррекция этих нарушений блокадой рецепторов эндотелина или введением аналогов простациклина является краеугольным камнем современной терапии.

Слайд 4

Классификация легочной гипертензии 2003 год, Венеция

1. Легочная артериальная гипертензия

- Идиопатическая ЛАГ
- Семейная ЛАГ
- Ассоциированная:
 - СЗСТ
 - ВИЧ инфекция
 - Портальная гипертензия
 - Антректики
 - ВПС
- Легочная вено-окклюзионная болезнь
- Легочный капиллярный гемангиоматоз

2. Поражение плевых отделов сердца

- Предсердие или желудочек
- Клапаны

3. Патология легких / гипоксемия

- ХОБЛ
- Интерстициальный фиброз
- Нарушения дыхания во время сна
- Аномалии развития

4. ЛГ вследствие тромботических или тромбоэмболических заболеваний

- ТЭ обструкция проксимальных ЛА
- ТЭ обструкция дистальных ЛА
- Нетромботические эмболии

5. Редкие

Simonneau et al; JACC 2004

Слайд 5

Легочная гипертензия при системных заболеваниях соединительной ткани

Системная склеродермия – наиболее частое заболевание соединительной ткани, ассоциируемое с легочной гипертензией.

Структура ЛГ обусловленной системными заболеваниями соединительной ткани, n = 113
Antoine Beclere Hospital, 1981-2000

Легочная артериальная гипертензия - одна из частых причин раннего летального исхода при ССД

Слайд 6

Диагностика ЛАГ: рекомендации Европейского Кардиологического Общества

I. ЛГ подозрение

- { Симптомы и физикальное обследование
- { Скрининг
- { Случайная находка

II. ЛГ обнаружение

- { ЭКГ
- { Рентгенография грудной клетки
- { Трансторакальная ЭхоКГ

III. ЛАГ дифференциация

- { ФВД и газы крови
- { Вентиляционно - перфузионная сцинтиграфия
- { КТ высокого разрешения
- { Мультиспиральная КТ
- { Ангиография
- { Биохимия и иммунология
- { ВИЧ тест
- { УЗИ брюшной полости (печень!)

IV. ЛАГ верификация и оценка

- { Нагрузочные пробы: 6 минутный тест,
- { Кардиопульмональные тесты
- { Гемодинамика: катетеризация с вазореактивными тестами

ESC Guidelines - Galie N, et al. Eur Heart J 2004; 25:2243-78.

Слайд 7

Легочная гипертензия:
ЭхоКГ – дефиниция:
 мягкая (начальная) легочная гипертензия может быть установлена при скорости трикуспидальной регургитации 2,8-3,4 м/с, что соответствует (в сумме с давлением в ПП = 5 мм.Нг) систолическому давлению в легочной артерии 36-50 мм.Нг (Venice III World Symposium PAH 2003)

Допплер ЭхоКГ (V*)

- V* 2.5 м/с (≈ sPAP 30 mmHg) → **НЕТ одышки (или обусловлена другими причинами)** → **Данных за ЛГ НЕТ**
- V* 2.5-3 м/с (≈ sPAP 30-45 mmHg) → **ОДЫШКА (в отсутствии других причин)** → **Подозрение на ЛГ**
- V* > 3 м/с (≈ sPAP > 45 mmHg) → **Подозрение на ЛГ**

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

V: скорость систолического транстрикуспидального потока
Hachulla E, et al. Arthritis Rheum 2005; 52:3792-800.

Слайд 8

Катетеризация правых отделов сердца:

- Верификация диагноза
- Дифференциальная диагностика (ДЗЛА, насыщение O₂ крови)
- Подбор терапии (вазореактивный тест)
- Определение прогноза (систолическая функция)

ДПП, ДПЖ, ДЛА, ДЗЛА

Давление, ммНг

Слайд 9

Функция внешнего дыхания с DLCO и бодиплетизмографией:

- Ранее выявление вариантов с изолированной ЛАГ (за 5-10 лет до ее развития)
- Дифференциальный диагноз вариантов поражения легких (в т.ч. сочетанной формы)
- Эффективность проводимой терапии

Ретроспективные уровни DLCO у пациентов с ССД - ЛАГ в сравние с больными без ЛАГ

	ЛАГ	ЛАГ + ИФЛ	ИФП
Клинические формы			
- диффузная	0 до +	++	+++
- лимитированная	+++	+	+
Аутоантитела			
- АЦА	+++	(?)	0
- ТнТн или U3RNP	+	++	++
- Топоизомераза	0	++	+++
- U1RNP	+	+	+
ФВД			
FVC < 60	-	++	+++
FVC/DLCO < 1,4	-	-	+++
FVC/DLCO > 1,6	+++	+++	-
DLCO < 60	+++	+++	++

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Легочная артериальная гипертензия. III класс (ВОЗ)

Трактир – революция в терапии

Эндотелиальная клетка

ET → ET_A / ET_B receptors → NO ↑, PGI₂ ↓

Гладкомышечная клетка / **Фибробласт**

ET → ET_A / ET_B receptors → Proliferation ↑, Fibrosis ↑

Эндотелиальная клетка

Big ET → ET_A / ET_B receptors → ET_A / ET_B → Proliferation ↑, Fibrosis ↑

Tracleer (Bosentan) blocks ET_A and ET_B receptors, inhibiting the ET pathway.

Строим будущее правильно с самого начала

АСТЕЛЮН