

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Крысова И.А.

ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава,

Кафедра детских болезней

Научный руководитель - доц. Н.П.Леушина

Заведующий кафедрой - проф. Я.Ю.Иллек

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) - типичный представитель оппортунистических инфекционных заболеваний человека, клинические проявления которых манифестируют только на фоне иммунодефицита человека. ЦМВИ - актуальная проблема перинатологии, т.к. является одной из наиболее часто встречающихся врожденных инфекций (0,2 -2,5 %) новорожденных детей. По Кировской области частота встречаемости примерно та же. Источником в/у инфицирования практически всегда является мать, перенесшая ЦМВИ во время беременности. В зависимости от сроков гестации, на котором произошло инфицирование, различают blastopatii, embriopatii и fetopatii. Наиболее частые типичные симптомокомплексы: тромбоцитопеничная пурпура (76% по нашим данным), желтуха (67%), гепатоспленомегалия (60%), микроцефалия (53%), гипотрофия (50%). В остальных случаях (вторичная ЦМВИ у беременных) - врожденная ЦМВИ характеризуется бессимптомным течением, однако при этом у 5 - 17% детей в дальнейшем может развиваться сенсорная глухота, задержка психомоторного развития, другие неврологические изменения. Диагностика: ДНК-гибридизация и полимеразная цепная реакция (ПЦР) абсолютно показана для постановки диагноза; иммуноферментный анализ (выявление Ig G, M). Показания для обследования новорожденного на ЦМВИ подразделяют на клинические: поражение ЦНС (очаговая неврологическая симптоматика, судороги, синдром угнетения, микроцефалия, гидроцефалия и НСГ находки - кисты, кальцификаты и т.д.); желтуха, гепатоспленомегалия, повышение аминотрансфераз; геморрагический синдром, анемия с ретикулоцитозом; недоношенность, синдром ЗВУР, и анамнестические: перенесенные матерью во время беременности мононуклеозоподобные заболевания; выявление у матери во время беременности сероконверсии к ЦМВ и маркеров репликации вируса; отягощенный акушерский анамнез. Современные терапевтические мероприятия при ЦМВИ предусматривают применение следующих препаратов: цитотект - специфический гипериммунный анти - ЦМВ-иммуноглобулин для внутривенного введения по 2 мл/кг/сут через день 3-5 введений; ганцикловир (цимевен) 5 мг/кг для внутривенного введения через день 2 раза в день в течение 2-3 недель;