

ID: 2013-02-23-T-1974

Тезис

Мещерякова Ю.Б., Суханова Э.А., Штыркова Е.В.

Сравнительный анализ степени выраженности афазий и тяжести неврологического дефицита при геморрагических и ишемических инсультах*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней*

Актуальность проблемы. Нарушения речевой функции по типу афазий являются наиболее частым последствием инсульта. Афазии встречаются в 25-35% наблюдений после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и в значительной мере ухудшают качество жизни, как самих пациентов, так и их близких. Поэтому изучение афазий является очень актуальной задачей.

Цели: выявить различия между речевыми расстройствами и тяжестью неврологического дефицита при геморрагическом и ишемическом инсультах.

Материалы и методы. Для проведения исследования нами было обследовано 32 пациента (18 мужчин и 14 женщин) с афазиями в возрасте от 45 до 86 лет (средний возраст $66,33 \pm 9,97$) в остром периоде инсульта. Геморрагический инсульт (ГИ) наблюдался у 17 пациентов (53%), ишемический (ИИ) – у 15 (47%). Всем пациентам проводилась оценка неврологического дефицита по шкале инсульта Национального Института здоровья (NIHSS) и оценка степени выраженности речевых нарушений с помощью опросника речи N.Lincoln, D.Wade.

Результаты. В группе пациентов с ИИ нами выявлено наличие средней корреляционной связи между степенью выраженности речевых нарушений и общей тяжестью неврологических проявлений инсульта ($r_3 = -0,649$ $p = 0,009$), тогда как в группе пациентов с ГИ корреляционная связь между данными показателями высокая ($r_3 = -0,8064$ $p < 0,0001$). Кроме того в нашем исследовании ГИ были ассоциированы с более молодым возрастом пациентов по сравнению с ИИ (соответственно $64 \pm 11,51$ и $71,8 \pm 8,1$ $p = 0,037$) и с более выраженной симптоматикой инсульта по шкале NIHSS (соответственно $10,89 \pm 5,1$ и $6,53 \pm 4,7$ $p = 0,008$). Выявленные нами различия между тяжестью афазии при ГИ ($11,06 \pm 6,4$) и ИИ ($14,53 \pm 4,97$) не являются статистически значимыми.

Выводы. Случаи афатических нарушений при ГИ (53% пациентов) ассоциированы с меньшим возрастом и с более выраженным неврологическим дефицитом. К тому же в данной группе корреляция между степенью выраженности речевых нарушений и общей тяжестью неврологических проявлений инсульта выше, нежели в группе ИИ. Отсутствие ожидаемых различий в тяжести афазии между группами может быть связано, на наш взгляд, с незначительной выборкой.

Ключевые слова

афазия