ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ И ТРАНСКУТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Иванов С.В., Охотников О.И.,
Голиков А.В., Бельченков А.В., Розберг Е.П.

УДК: 616.36-008.5-08

ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Росздрава

Резюме

Предложена новая классификация билиарной гипертензии, на основании которой обоснован алгоритм сочетанного применения малоинвазивных эндоскопических и чрескожных под УЗИ наведением вмешательств при лечении осложнённого течения ЖКБ у лиц пожилого и старческого возраста. Приведена статистика осложнений и летальности при использовании данного вида оперативных вмешательств.

Ключевые слова: механическая желтуха, лечение.

Среди пациентов с механической желтухой желчно-каменного генеза лица старше 60 лет с высоким уровнем операционного риска составляют 48,5–65,2% [2, 3, 5, 9, 13, 14]. Осложнения механической желтухи, пожилой возраст пациентов, декомпенсация сочетанной соматической патологии обуславливают высокую послеоперационную летальность, уровень которой у пожилых больных доходит до 80% [2, 10, 11, 13, 14, 19]. Наиболее актуальным, в силу своей сложности и неудовлетворительности результатов лечения разделом билиарной хирургии в настоящее время является лечение синдрома механической желтухи у лиц пожилого и старческого возраста с отягощенным соматическим анамнезом, которые составляют большую часть от всех больных с осложнениями ЖКБ [2, 11, 13, 19].

В настоящее время ведущим методом лечения больных с синдромом механической желтухи пожилого и старческого возраста являются эндоскопические транспапиллярные технологии [1, 3, 4, 8, 18]. Однако, по ряду причин, остается достаточно высоким процент неудач и осложнений при их использовании. Одним из методов разрешения механической желтухи при невозможности эндоскопического пособия у больных с множественной сопутствующей патологией являются малоинвазивные чрескожные вмешательства под ультразвуковым наведением [6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19].

Успешное лечение больных указанной категории во многом зависит от выбора диагностических и лечебных мероприятий. [9, 14, 19].

Цель исследования: обоснование применения миниинвазивных технологий при диагностике и лечении механической желтухи неопухолевого генеза.

Материал и методы исследования

В клинике хирургических болезней №1 КГМУ с 2005 г. по 2009 г. под нашим наблюдением находился 341

TRANSPAPILLAR AND TRANSCUTANEOUS TREATMENT TECHNIQUES IN BENIGN OBSTRUCTIVE JAUNDICE

Ivanov S.V., Okhotnikov O.I., Golikov A.V., Belchenkov A.V., Rozberg E.P.

The article introduces a new biliary hypertension classification, on which a surgical algorithm of combined minimally-invasive endoscopic and transcutaneous Ultra-Sound-assisted interventions to treat complex bile diseases in senior and aged patients, showing the complications and mortality statistics when such surgical techniques are used.

пациент с холедохолитиазом. Женщин было 243 (71,3%), мужчин – 98 (28,7%). Средний возраст больных составил 63,2±16,3 года.

В лечении больных был применён разработанный нами способ лечения механической желтухи (патент РФ на изобретение №2268657), заключающийся в выборе рациональной лечебно-диагностической тактики на основании предложенной классификации типов желчной гипертензии. Согласно предложенной классификации, по данным ультразвукового исследования гепатопанкреатобилиарной зоны, при I типе отмечается расширение желчных путей и желчного пузыря до конглоуенса, при II типе желчной гипертензии присоединяется расширение внутрипеченочных желчных ходов, включая протоки III порядка. При первом типе желчной гипертензии лечебные мероприятия начинали с эндоскопических транспапиллярных вмешательств (ТПВ). После купирования эндотоксикоза и устранения причины обструкции желчного дерева выполнялась радикальная операция – холецистэктомия. При втором типе желчной гипертензии холестаз купировали с помощью чрескожной чреспеченочной холангиостомии (ЧЧХС).

Результаты исследования

Ведущей причиной возникновения механической желтухи на фоне ЖКБ в рассматриваемой группе явился холедохолитиаз (86,2% наблюдений). Учитывая, что 87,5% от числа наблюдений составили лица старше 60 лет, рассмотрена сопутствующая соматическая патология. Большинство пациентов имело сочетанное поражение сердечно-сосудистой системы – 83%. Второе место занимает церебральный атеросклероз и его осложнения – 6%. ХОБЛ была диагностирована в 5% случаев.

Большее число пациентов с сочетанной патологией (74,7%) имели 3 и более соматических заболевания в анамнезе.

Согласно предложенному нами алгоритму, при I типе желчной гипертензии эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) была произведена 265 (77,6%) пациентам. После ЭПТ выполнялась инструментальная ревизия желчных протоков, механическая литотрипсия и механическая литоэкстракция. Осложнения полученные при проведении эндоскопических вмешательств представлены в таблице 1.

Осложнения после ЭПСТ наблюдались у 88 (33,2%) пациентов, в 2 наблюдения ретродуоденальной перфорации и 2 случая панкреонекроза закончились летальным исходом. В одном случае кровотечение из папиллотомной раны было расценено при ФГДС как профузное, больная была оперирована – выполнена экстренная лапаротомия. Летальный исход наступил в раннем послеоперационном периоде от острой дыхательной недостаточности. Остальные из приведённых осложнений ЭПСТ были купированы консервативными мероприятиями. При остром панкреатите и панкреонекрозе летальность составила – 1,5%.

При II типе желчной гипертензии лечение начинали с ЧЧХС – 76 (22,4%) пациентов. Показанием для выполнения данного типа малоинвазивных оперативных вмешательств мы считали:

- пожилой и старческий возраст пациентов при наличии 3-х и более сопутствующих заболеваний;
- диаметре конкремента в холедохе более $22,94 \pm 8,07$ мм;
- анатомические особенности операционной зоны, затрудняющие проведение транспапиллярного вмешательства (БСДК в глубоком дивертикуле, выраженные деформации терминального отдела холедоха, особенности анатомического строения БСДК и 12-перстной кишки, состояние после резекции желудка по способу Бильрот – II, деформация 12-перстной кишки);
- развитие осложнений со стороны поджелудочной железы после эндоскопической попытки ПСТ.

В этой группе дренирующие лечебные вмешательства сочетали с антеградной контактной холангиолитотрипсией и литоэкстракцией под контролем видеохоледохоскопии. Манипуляции были проведены 55 пациентам (72,3%). У 17 из них (30,9%) проводилась антеградная баллонная пластика БСДК. В 11 случаях (30,3%) пациенты были выписаны на амбулаторное лечение с

наружно-внутренним дренажем. После контрольного обследования через месяц дренажи из желчных протоков были удалены.

Клинический пример

Больная В., 83 лет, ИБ №8185, поступила в хирургическое отделение с диагнозом: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз. Механическая желтуха. В анамнезе множественная, сочетанная сердечно-сосудистая патология. При ультразвуковом исследовании установлен второй тип желчной гипертензии, в дистальном отделе холедоха 2 конкремента 17 и 24 мм. Произведена ЧЧХС (рис. 1). Далее проведена антеградная литотрипсия и литоэкстракция, баллонная дилатация БСДК (рис. 2). Холангиостома заменена на дренаж меньшего диаметра (рис. 3). Больная выписана. Через 1 месяц после выписки холангиостома удалена.

Осложнения после чрескожных вмешательств имели место у 6 (7,8%) больных (таб. 2).

Случай наружного кровотечения был купирован консервативно местными мероприятиями; экссудативные образования брюшной полости потребовали пункции и перкутанного дренирования под ультразвуковым наведением. Пневмоторакс был устранён дренированием плевральной полости. Случай внутрибрюшного кровотечения потребовал лапаротомии, но несмотря на принятые меры в раннем послеоперационном периоде, на фоне декомпенсации сопутствующей патологии, наступил летальный исход. Таким образом, летальность в этой группе составила 1,3%.

У 19 (5,6%) пациентов после миниинвазивных вмешательств направленных на восстановление пассажа жёлчи было выполнено эндобилиарное стентирование.

Плановая лапаротомия у пациентов с ЖКБ и холедохолитиазом была выполнена 38 больным (13,2%) (табл. 3).

Послеоперационные осложнения отмечены в 4 случаях (10,6%). Они были представлены восходящим тромбозом большой подкожной вены, который потребовал экстренной кроссэктомии, нагноением послеоперационной раны, госпитальной пневмонией, тромбозом глубоких вен голени. Летальных исходов после плановых операций не было.

Выводы

1. В группе пациентов пожилого и старческого возраста, с множественной конкурирующей по тяжести клинического течения патологией, эндоскопические транспапиллярные вмешательства, направленные на купирование механической желтухи, вследствие осложнённого холедохолитиазом течения ЖКБ, сопровождаются высокой частотой осложнений (33,2%).
2. Наиболее частым осложнением эндоскопических транспапиллярных вмешательств при механической желтухе является острый панкреатит и панкреонекроз (19,9%).
3. При неэффективности эндоскопических способов устранения причин механической желтухи, альтерна-

Табл. 1. Осложнения ЭПСТ

Характер осложнения	Общее количество	%
Ретродуоденальная перфорация	2	0,7
Панкреонекроз	14	5,2
Острый отечный панкреатит	39	14,7
Кровотечение из зоны папиллотомии	18	6,8
Гнойный холангит	14	5,3
Кровотечение из зоны папиллотомии и острый панкреатит	1	0,4
Всего:		33,2

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Табл. 2. Осложнения после ЧЧХС

Характер осложнений	Число наблюдений	%
Кровотечение при бужировании канала	1	1,3
Кровотечение из места пункции печени	1	1,3
Экссудативное образование поддиафрагмального пространства	1	1,3
Экссудативное образование подпеченочного пространства	2	2,6
Пневмоторакс	1	1,3
Всего:	6	7,8%

Табл. 3. Виды плановых оперативных вмешательств у пациентов с осложнённым течением ЖКБ

Вид вмешательства	Число больных	%
Холецистэктомия, холедохолитотомия, холедоходуоденоанастомоз, холедохоюноанастомоз	15	39,5
Холецистэктомия, холедохолитотомия, трансдуоденальная папиллосфинктеропластика	23	60,5
Итого	38	100,0

тивным малоинвазивным способом её лечения может быть ЧЧХС под УЗИ наведением.

4. Транскутанные вмешательства сопровождаются низким (7,9%) числом осложнений и минимальной летальностью (1,3%), что благоприятно влияет на исход лечения этой тяжелой категории больных.

Литература

1. Балалыкин А.С. ЭРПХГ, ЭПТ и чреспапиллярные операции – успехи и проблемы. // Сб. тезисов 3 Моск. межд. конгресса по эндоскопической хирургии. – М. – 1999. – С. 22–24.
2. Бурков С.Ж. Желчнокаменная болезнь у пожилых людей. Варианты клиники, течения, диагностики, лечения. // Врач. – 1997. – № 11. – С. 8–10.
3. Галлингер Ю.И., Хрусталева М.В. Камни желчных протоков: клиника, диагностика, современные методы лечения // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2006, № 5. – С. 50–58.
4. Гальперин Э.И., Громова И.В., Зубарева Л.А., Гращенко С.А., Кузовлев Н.Ф. Холедохолитиаз — эндоскопические возможности его разрешения. // Анналы хир. гепатологии 1998. № 3. С. 46–47.
5. Данилов М.В., Глабай В.П., Кустов А.Е. и др. Хирургическое лечение больных механической с желтухой неопухоловой этиологии. // Анналы хирургии и гепатологии. 1997. Т. 2. С. 110–116.
6. Диагностические и лечебные процедуры под ультразвуковым контролем у больных механической желтухой / А.Н. Лотов, С.А. Кондрашин, В.Я. Заводнов и др. // Хирургия. – 1996. – №3. – с. 57–58.

7. Ившин В.Г., Якунин А.Ю., Макаров Ю.И. Чрескожные чреспеченочные диагностические в лечебные вмешательства у больных с механической желтухой // *Анналы хир. гепатологии*. 1999 Т. 1. С. 121–131.
8. Котовский А.Е. Отдаленные результаты эндоскопической папиллосфинктеротомии // *Анналы хирургической гепатологии*. – 1997. – №2. – с. 132–135.
9. Нестеренко Ю.А., Шаповальянц С.Г., Климинский И.В. и др. Хирургическая тактика при механической желтухе // *Хирургия*. – 1990. – № 2. – С. 14–17.
10. Панцырев Ю.М. Декомпрессивные вмешательства при осложненном течении желчекаменной болезни // *Съезд хирургов Молдовы*. – 1991. – С. 23–24.
11. Паршиков В.В. Обоснование метода хирургического лечения механических желтух неопухолевого генеза у пожилых больных. Автореф. дисс. канд. мед. наук. – Н. Новгород, 1999. – 21 с.
12. Пипия В.И., Цхакая З.А., Пипия Г.В. и др. Чрескожная чреспеченочная холангиография, холангиостомия и эндопротезирование желчных путей при механической желтухе // *Вестн. рентгенол.* – 2000. №10. С. 54–57.
13. Сотниченко Б.А., Гончаров Н.В. Холедохолитиаз у больных пожилого и старческого возраста // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. 2001. № 2. С. 113–117.
14. Тиленко И.А. Диагностика и лечение механической желтухи у больных пожилого и старческого возраста // *Хирургия*. – 1989. – № 8. – с. 98–101.
15. Харченко В.П., Лютфалиев Т.А., Кунда М.А. Чрескожные чреспеченочные эндобилиарные декомпрессивные вмешательства при желтухе неопухолевой этиологии // *Мед. радиол.* 2000. №3. С. 60–67.
16. Bonnel O.H., Liguory C.E., Comud F.E., Lefebvre J.F. Common bile duct and intrahepatic stones: results of transhepatic electrohydraulic lithotripsy in 50 patients // *Radiology*. – 1991. Vol. 180. №2. P. 345–348.
17. Chen M.E., Jan V.V. Percutaneous transhepatic cholangioscopic lithotripsy // *Br. J. Surg.* – 1990. Vol. 77. № 5. P. 530–532.
18. Lee J.G., Leung J.W. Endoscopic management of difficult common bile duct stones // *Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am.* – 1996. Vol. 6. № 1. P. 43–55.
19. Matsumoto S., Miyazaki R., Okamoto K., Maeshiro K., Ikeda S. Management of giant common bile duct stones in high-risk patients using a combined transhepatic and endoscopic approach // *Am. J. Surg.* – 1997. Vol. 173. № 2. P. 115–116.

Контактная информация

Розберг Е.П.
 ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Росздрава,
 Кафедра хирургических болезней №1
 тел.: +8 (904) 525-88-18
 e-mail: elena.rozberg@mail.ru